

# 千金要方

附衍義  
江左書林印


10

○ Chinese

Vol. X

v. 17 - v. 18







長洲張 潞路玉衍義  
南沙席 世臣鄧容校

肺臟方凡八類

肺臟脈論第一論一首

論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣內主胸與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻主藏魄號為魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣為效在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物 凡肺藏象金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脈浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯葉萎枝條兀然獨在其脈為微浮衛氣遲榮氣數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中二氣感故故陽中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏故名曰瘧弱則發熱浮乃來出旦中旦發暮中暮發藏有遠近脈有遲疾周有度數行有漏刻遲在上傷毛米數在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反在下陰反在顛故名曰長而且留秋脈如浮秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而脊痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音 肺脈來厭厭蟲蟲如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病葉源無肺不字脈來如物之浮如風吹毛曰肺死 真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折乃死 秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病 肺藏氣氣舍魄喜樂無極



則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏 手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫  
皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪<sup>一作枯</sup>毛折毛折則氣先  
死而篤丁死火勝金也 肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺王其脈微溫而短曰平反  
得大而緩者是脾之乘肺母之歸子為虛邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺子之乘母為實邪  
雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘肺火之尅金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘  
肺木之陵金為微邪雖病即瘥肝乘肺必作虛 右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中塞  
噤逆刺手陽明治陽 右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿膨膨與肩相引刺手太陰治陰  
肺脈來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰雖經病四至曰脫精五至死六至命盡手太陰脈  
也 肺脈急甚為癲疾微急為肺寒熱急情欬唾血引腰背胸苦鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏  
風<sup>一作風</sup>頭已下汗出不可止大甚為脰腫微大為肺痺引胸背起腰內小甚為殮泄微小為消痺滑甚為  
息責上氣微滑為上下出血滑甚為嘔血微滑為鼠瘻在頸肢掖之間下不勝其上其能喜酸 肺脈搏  
堅而長當病唾血其濡而散者當病漏<sup>一作汗</sup>至今不復發散 白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積  
氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使之內也 黃帝問曰經脈十二而手太陰之脈獨動不休  
何也手太陰本在寸口中岐伯對曰足陽明胃脈也胃者五臟六腑之海<sup>胃脈在足趺上大趾間</sup>其精氣  
上清注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸不已脈動  
不止黃帝問曰氣口何以獨為五臟主岐伯對曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以  
養五臟氣氣口者太陰是也臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑臟主即呼寸口者也 扁鵲  
曰肺有病則鼻口張實欬則喘逆胸憑仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則  
夢涉水等 肺在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺精氣并於肺則悲也 味主秋結滿而血者  
病在胸及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合 病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之



脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出病在肺下肺慧日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麋肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜赤藥凡肺病之狀必喘

欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝腠脇臍足皆痛虛則少氣不能報息耳聾噓乾取其經手太陰足太

陽之外厥陰內少陰血者肺脈沉之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰以

上汗出得之房內汗出當風肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脈微遲為可治宜服五味子大補

肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸臍中百壯

第三椎二十五壯邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外膺背第三椎之傍

以手重按之快然乃刺之取之缺盆中以越之形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上

行肺氣傷其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此為躁擾噴怒欬逆肺傷氣擁所致也肺中風

者口燥而喘身運而重冒而腫脹肺中寒者其人吐濁涕肺中水者其人身體腫而小便難時時大

便如鴨澹肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大太陽脈浮緩少陽脈微緊微為血虛緊為微寒

此為鼠乳診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下時時痛逆背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈

夏劇王皮中時痛如蟲緣之狀甚者如鍼刺之狀時瘥色白也肺之積名曰息責在右脇下覆大如杯

久久不愈病灑灑寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者

不受邪肺復欲還心心不肯受因留結為積故知息責以春得之肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血

其脈當短濇今反浮大其色當白而反赤者此是火之尅金為大逆十死不治商音人者主肺聲也肺

聲哭其音嚶其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊于陰氣外傷傷則寒寒則虛

虛則厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短僊四肢辟弱面色少華遺失便利甚則不可治依源

麻黃續命湯主之方見第八卷又言音喘急短氣好唾此為火尅金陽擊陰陰氣沉陽氣升升則實實則

熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口亦而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不欬可



治也 肺病為癰者令人心寒寒甚則熱熱聞善驚如有所見者恒山湯主之方見第十卷 若其人本來語聲雄烈忽爾不亮御氣用力方得出言而及於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應依源審治乃不失也 白為肺肺令皮白如豕膏者言肺主鼻鼻是肺之餘其人身形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精瘦急心靜悍性喜為吏治秋冬不耐春夏夏感而生病主手太陰廉脈然肩膺厚薄正疎則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲善病胸喉痹逆氣巨肩反膺隘喉者則肺高則實實則熱上氣肩急欬逆合腋張脇者則肺下下則逼責迫肝善脇下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端正則和利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病胸痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實瀉虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指廣點見顏頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還面白目青是謂亂經飲酒當風入肺經膽氣妄泄目則為青雖有夭救不可復生面黃目白如枯骨死吉凶之色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也 秋金肺脈色白主手太陰脈也秋取經脈秋者金始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未能深入故取膺以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合其脈本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下動脈其脈根於太倉太倉在臍上三寸一分是也 其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臍內廉入腋下上出缺盆結肩髃前上結缺盆下結胸裏散貫貫下抵季脇 其脈起於中焦下絡大腸還循胃口上



膈屬肺從肺系橫出腋腋下循膈內行少陰心主之前下肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指內廉出其端合手陽明為表裏陽明之本在肘骨中同會於手太陰太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際別走手陽明主肺生病實則大腸熱熱則手兌掌起起則陽病陽脈反逆大於寸口三倍病則效上氣喘渴煩心胸滿膈臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則欠效小便遺數數則陰病陰脈反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息李膈空痛尿色變卒遺失無度 秋三月者主肺大腸白氣狸病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊蹙發泄邪生則臟腑傷溫隨秋受厲其病相反若腑虛則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若臟實則為陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣狸病也 扁鵲曰灸心肝二腧主治丹毒白狸病當依源為療調其陽理其陰則臟腑之病不矣

肺虛實第二 脈四首 方二十首

肺實熱 右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱胸憑仰息泄氣降熱方 石膏八兩 白前 杏仁 白木 橘皮 枸杞根皮 赤蜜

七合 右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

行義

肺為天一生水之上源脾為厚土生金之母今因肺過熱燥不能施白露下降之令故用石膏白前赤蜜滋降秋燥杏仁橘皮枸杞根皮泄其逆滿尤妙在白木一味培土安金填塞壯火遊行之路庶幾金不受鑠水能承制而無陰火土協心包逆乘母氣之虞設不預為籌度專力耗氣泄火未免熱去寒起則與時師奚擇哉

治肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方 桃皮 芫元 格一 右二味咬咀以水四斗煮取一斗五升去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數日即歇



**行義** 肺合皮毛肺氣內壅已極不堪更以湯藥助滿故用破血導水之味漬布搭胸使藥氣內通濁氣外泄乃奇兵解圍之策從十三篇中悟出

**橘皮湯** 治肺熱氣上欬息奔喘方 橘皮 麻黃 柴胡 紫蘇刪繁作乾 藍各三兩 杏仁 宿薑略四兩 石膏八兩

右七味咬咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

**行義** 肺滿上氣喘欬本當用麻黃越婢麻杏甘石等方慮其甘草大棗助滿故易橘皮紫蘇以散上奔之氣膽欲大而心欲小之作用略見一斑

治肺熱喘息鼻衄血方 羚羊角 元參 射干 雞蘇 芍藥 升麻 柏皮略三兩 生地切一升 梔子仁

四兩 淡竹茹雞子大 右十味咬咀以水九升煮取三升分三服須利者下芒硝三兩更煮三沸

**行義** 肺熱喘衄良由龍雷煽虐反侮肺金之象故用羚羊入肝散血射干入肺散氣梔子柏皮分解

於內升麻雞蘇開提於內芍藥地黃順血下注元參竹茹抑火前通若勢劇須利者下芒硝以急奪之自然龍火潛蹤金不受侮烏有喘衄之患乎

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘者方 麻黃四兩 甘草 五味子各三兩 杏仁五十粒 母薑五兩

淡竹葉切一升 右六味咬咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥者取三升去滓分三服

**行義** 前方以梔子柏皮佐羚羊散上溢之血升麻雞蘇佐射干散上盛之氣此方以竹茹杏仁佐服

開發肺氣五味甘草佐母薑收攝膽泄膽寘則目青自除風息則氣喘自己二方所宗總不出梔子柏皮湯麻黃連翹赤小豆湯射干麻黃湯等方之變法

瀉肺散 治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺而目黃腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絕心下絃急

不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔方 五味子 百部各二兩 茯苓 附子 肉蓯蓉 石解

當歸 遠志 川續斷略一細辛 甘草各七 防風 川椒 芫花 桂心 乾薑 欬冬各一兩 桃仁

六十 杏仁三十枚 右十九味治下篩酒服方寸匕日三後稍加至二匕



**行義** 瀉肺而用紫菀款冬茯苓專為酒客湊肺而設防風細辛杏仁專為風客於肺而設五味子百部石斛專為木盛生風而設當歸續斷桃仁專為勞倦傷血胸痛引背而設甘草乾薑川椒專為飲食欲吐面目黃腫而設桂附遠志茯苓專為起即頭眩忽忽欲絕上盛下虛而設苟非固脾胃之根本安能任肺氣之疎泄歟

灸法

肺脹氣搶脇下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃脘兩邊相去一寸胃脘在心下三寸肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各七壯肺與大腸俱實右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂疾痺痛手臂捲脣吻不收名曰肺與大腸俱實也

者散治肺與大腸俱實令人氣逆方麻黃茯苓各六黃芪大青桂心各三細辛杏仁各三

石膏二兩丹參半兩五味子甘草橘皮貝母川芎各一枳實二枚右十五味治下篩為粗散

帛裹一方寸匕半以井花水一升五合煮取七合為三服日再

**行義** 邪之所湊其氣必虛故治肺與大腸俱受客邪而實用麻黃湯及麻杏甘石湯之製以解風從

火化之熱必兼五味以收肺氣之逆黃芪以飲麻黃之散其餘等味皆疎泄痰氣之亞耳

肺虛冷右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息喘乾不津液名曰肺虛冷也

治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛者風入肺方防風獨活川芎秦椒乾薑黃芪各二

針四天雄麻黃山萸肉五味子各三甘草六針秦羌桂心山藥杜仲人參細辛

防己各三紫菀各二貫衆二枚附子七分右二十二味治下篩以酒服方寸匕日二服一

方有石膏六分當歸五分

**行義** 風入肺絡而致聲嘶語難用力戰掉故用麻黃附子細辛開發肺寒防己貫衆通行經脈參芪

甘草保護肺氣雄桂椒薑協濟附子之雄防獨羌秦助力麻辛之散芫味薯桂匡扶參芪之補甘菊紫



苑專化雄附之烈其方似乎龐雜而實井井有條各具相制之妙非洗心求之不能得其真義

酥蜜膏酒

治肺氣虛寒癯風所傷語聲嘶塞氣急喘噎欬唾上氣通聲方 酥 崖蜜 飴糖 生薑

汁 生百部汁 棗肉 杏仁格一研相皮五具 右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久取薑汁

等各減半止溫酒一升服方寸匕細細咽之日二夜一〇又方 猪脬三具大棗百枚 右二味以酒五

升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脬亦得治欬嗽胸脇支滿多喘上

氣尤良附后方治久嗽上氣二十年諸治十瘥者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方 棗肉二斤研 杏仁二升熬 生薑汁 白糖 白蜜 生百部汁

格一右七味合和微火煎常攪約一炊久下之細細溫清酒服二合日二

衍義 肺竅為風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用薑汁杏仁相皮百部溫散肺絡之結膠飴棗

肉乳酥崖蜜通行脾肺之津津回燥潤津自復矣厥後大腸腑門通聲膏從此化出 又方專取猪脬

滌除痰垢大棗通行津液漬酒治證如前或易羊脬入肺尤捷〇又方即酥蜜膏酒倍用棗肉杏仁之

通津而去相皮之耗氣

補肺湯 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方 五

味子三兩 乾薑 桂心 欬冬花各二兩 麥冬一升 桑根白皮一斤大棗一百枚 粳米二合 右八味以

水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三升分三服〇又方 治肺胃虛寒喘乏少食不能飲食 黃芪

五兩 甘草 鍾乳人參各二兩 地黃 桂心 茯苓 白石英 桑白皮 厚朴 乾薑 紫苑 橘

皮 當歸 五味子 遠志 麥冬各三兩 大棗一升 右十八味以水一斗四升煮取四升分三服

日三夜二〇又方 治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲食方 蘇子一升 桑白皮五兩

半夏六兩 紫苑 人參 甘草 五味子 杏仁各二兩 欬冬花 射干各一兩 麻黃 乾薑 桂心各三兩

細辛一兩 右十四味以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二〇又方 治肺氣不足欬逆



短氣寒從背起口中如含霜雪語無聲音而渴古本乾燥方 五味子 蘇子格一白石英 鍾乳兩

款冬花 竹葉 橘皮 桂心 桑白皮 茯苓 紫苑各一兩麥冬 四兩 生薑 五兩 杏仁五十枚 粳米

二合大棗十枚 右十六味 㕮咀以水一斗三升 先煮桑白皮粳米大棗以米熟去滓內諸藥者取五升

分六服日三〇又方 治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾膿血胸痛手足煩熱渴然自驚皮

毛起或哭或歌或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白方 款冬花 桂心各二兩桑白皮 一斤 生薑

五味子 鍾乳各三兩麥冬 四兩 粳米 五合 大棗十枚 右九味 㕮咀以水一斗二升 先煮粳米棗令熟去

滓內藥煎取二升分三服溫服之 一方用白石英二兩廣濟有紫苑人參各二兩名紫苑湯

**行義** 補肺湯五方首言寒從背起背者胸之膺肺之舍故用乾薑桂心溫胸中之寒款冬二冬滋胸

中之燥五味桑皮理胸中之邪大棗粳米培胸中之氣溫補肺臟本寒而兼清解標熱也 其第二方

兼溫補肺胃虛寒故用鍾乳石英薑桂之屬力助參芪之補氣歸地之滋血且中藏生脈以化石藥之

悍厚朴橘皮紫苑桑皮開泄胸中之滯 其第三方雖證見欬吐涎沫因有胸中引急知為正虛邪實

故於射干麻黃湯中除去大棗之戀膈參入麻黃湯中桂封二味更加人參易乾薑助胃祛邪蘇子桑

皮止逆安神乃寓補於瀉之奧旨非精熟金匱之法者難以語此 其第四方方下主治較之首方惟

吐血舌乾稍為不同然方中紫苑款冬二冬未嘗不治吐血但易生薑加竹茹專為古乾起見必其人

形神羸瘠以故參之第二方中石英鍾乳兼溫肺胃二經也 其第五方良由金衰不能制木木邪橫

干諸藏方下所云心腹支滿濁陰逆上也欬逆上氣唾膿血胸中痛火逆上乘肺位也手足煩熱四肢

為諸陽之本也惕然自驚邪干心包也皮毛起或哭邪干肺也或歌邪干脾也或怒木邪自暴也乾嘔

邪干胃也煩心邪干膻中也耳聞風雨聲陰邪上走腎竅也難證見諸經受邪總以收攝虛陽兼清旺

氣為主方中鍾乳桂心五味非收攝虛陽之用乎款冬二冬桑皮薑棗粳米非兼清旺氣之用乎合五

方論之可見補正必需辛溫散標不離清潤



麻子湯

治肺氣不足欬唾膿血氣短不得臥方

麻子一升桑皮

錫

桂枝

人參

阿膠

紫苑

各一兩

生薑

乾地黄

右九味

以水一斗五升

合煮取四升

分五服

行義

此炙甘草湯之變方因欬唾血膿肺中津傷故用人參阿膠地黃麻仁以滋津血之燥生薑桂枝以散肺氣之結紫苑即甘草之變味桑皮即麥冬之變味錫糖則大棗之變味耳

錫煎

治肺氣不足咽候苦乾方

作錫任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攪火上煎勿令堅令連服如雞子大漸漸服之日三夜二

行義

肺胃一氣貫通肺氣不足實由胃中津枯不能上滋於肺所以咽候苦乾但取建中湯中之二

以資胃氣而助蒸化之力也

治肺風氣萎絕四肢滿脹喘逆胸滿方

灸肺腧各二壯肺腧對乳引繩度之在第三椎下兩傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯

治肺與大腸俱不足虛寒之氣小腹拘急腰痛羸瘠百病方

大棗

生薑

桂心

各三

甘草

二兩芍藥

六兩

右五味

以水八升

煮取三升

去滓

合飴糖

八兩

煮三沸

分三服

人參各二兩

名黃芪

建中湯

行義

桂本血藥而辛溫散邪恐其動血故以芍藥護持榮氣不使隨桂外泄得甘草之甘溫而和寒熱諸邪薑棗之辛甘而和榮衛諸氣為風傷衛之首方參入膠飴一味取稼穡之甘便為建中專藥所以寒傷榮之天中脈微虛寒之裏氣不足咸賴乎此允為虛羸和解中外之聖

肺勞第三

論一首

方三首

論曰

凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之



則死順之則治逆之則亂反順為逆是為闕格病則生矣

麻黃引氣湯

治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方

麻黃 杏仁 生薑 半夏各五 紫蘇四分 白前

細辛

桂心各三

橘皮二分

石膏八兩

竹葉切一

右十一味

㕮咀以水一斗

煮取三升

去滓分三服

行義

勞役而邪并於肺故用金匱厚朴麻黃湯中麻黃石膏杏仁細辛以泄肺滿澤漆湯中半夏生薑白前桂心以滌痰垢參入紫蘇橘皮竹葉以助麻黃半夏石膏之力引清氣上升濁氣下降喘息面腫隨手可瘥矣

半夏湯

治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇氣滿從胸達背痛飲食即吐虛乏不足方

半夏一升 生薑

一斤

桂心四兩

甘草

厚朴各二

人參

橘皮

麥冬各三

右八味

㕮咀以水一斗

煮取四升

分四服

腹痛加當歸二兩

行義

勞乏而胸中陽氣不布濁陰上攻逆滿原非本虛之謂故用參桂薑半溫中麥冬甘草滋肺即兼厚朴橘皮開泄滯氣胸中陽氣得人參薑桂守護之力則濁陰不復上僭矣

厚朴湯

治肺勞風虛冷痰澀水氣晝夜不得臥頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢方

厚朴

麻黃

桂心

黃芩

石膏

大戟

橘皮各二

枳實

甘草

秦朮

杏仁

茯苓各三

細辛

二兩

半夏一升

生薑十兩

大棗十五枚

右十六味

㕮咀以水一斗

三升煮取四升

去滓分五服

行義

痰澀水氣積於胸中不能眠臥故彙採金匱射干麻黃湯厚朴麻黃湯澤漆湯中泄肺諸味參入大戰與射干澤漆味雖變而功用不殊其餘枳橘茯苓秦朮不過為麻朴薑半之佐輔苟不知金匱之淵源無以推千金之發派

治喉痺氣逆欬嗽口中唾涎方

灸肺腧七壯

亦可隨年至百壯

氣極第四

論一首

方六首

論曰凡氣極者主肺也

肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒溫

則死順之則治逆之則亂反順為逆是為闕格病則生矣

麻黃引氣湯

治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫方

細辛

桂心各三

橘皮二分

石膏八兩

竹葉切一

右十一味

㕮咀以水一斗

煮取三升

去滓分三服

行義

勞役而邪并於肺故用金匱厚朴麻黃湯中麻黃石膏杏仁細辛以泄肺滿澤漆湯中半夏生薑白前桂心以滌痰垢參入紫蘇橘皮竹葉以助麻黃半夏石膏之力引清氣上升濁氣下降喘息面腫隨手可瘥矣

半夏湯

治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇氣滿從胸達背痛飲食即吐虛乏不足方

一斤

桂心四兩

甘草

厚朴各二

人參

橘皮

麥冬各三

右八味

㕮咀以水一斗

煮取四升

分四服

腹痛加當歸二兩

行義

勞乏而胸中陽氣不布濁陰上攻逆滿原非本虛之謂故用參桂薑半溫中麥冬甘草滋肺即兼厚朴橘皮開泄滯氣胸中陽氣得人參薑桂守護之力則濁陰不復上僭矣



之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胸常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬則短氣暮則甚陰氣至濕氣生故甚陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血然陽病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五臟半死矣 扁鵲曰氣絕不治喘一作奔而冷汗出二日死氣應手太陰太陰氣絕則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散 治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚其氣短息寒亦治百病令入力強能飲食去風冷方 鍾乳別

乾薑 桔梗 茯苓 細辛 桂心 附子 人參各一兩 白朮一兩 防風 桔葉根 牡蠣各一兩 右

十二味治下節酒服方寸匕日三漸加至二匕五十以上可數服得力乃止有方云有冷加椒

衍義 氣極虛寒而用鍾附薑桂細辛參苓白朮世所共能反用桔防之耗氣桔葉之化熱牡蠣之

陰人所共昧曷知耗氣專為救本化熱專為散標欬陰專為復陽能達此義則鍾乳白朮之反激尤

從此聆悟矣腎臟門中寒食鍾乳散即此

黃芪湯 治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病虛損力乏方 黃芪四兩 人參 白朮 桂

生薑八兩 大棗十枚 附子三十枚 方不用 右七味咬咀以水八升煮取二升去滓分四服

衍義 前方兼治標熱故須耗氣欬陰此方專力救本所以純用溫補但加薑棗以和藥

大露宿丸 治氣極寒痺不已內含於肺寒氣入客於六腑腹脹喘滿寒冷積聚百病方

乾薑 桂心 皂莢 桔梗 附子各三兩 右六味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三

火等

衍義 見前第十六卷痼冷積熱門

疏黃丸 治氣極虛寒辭飲胸中痰滿心腹痛氣急不下飲食方 疏黃 礬石



桂心 細辛 白朮 桔梗 茯苓 二右十味為末蜜丸如梧子酒服十丸日三漸加之以知為度

附後無白朮桔梗茯苓用吳茱萸黃芩人參皂莢各十二味為丸用治人大冷夏月溫飲食不解衣者  
**行義** 疏黃專化陰毒 石專攻堅癖餘皆平熱破積峻味惟桔梗茯苓為化熱毒之用

大前胡湯 治氣極傷熱喘息衝胸常欲自走心腹滿痛內外有熱煩嘔不安方 前胡八兩半夏麻黃芍藥各四生薑五兩黃芩三兩枳實四枚大棗十二右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

**行義** 氣極傷熱而用前胡麻黃開發於外半夏枳實消豁於內芍藥黃芩清解於中生薑大棗兼和中外也

竹葉湯 治氣極傷熱氣喘甚則唾血短乏不欲食口燥咽乾方 竹葉二升麥冬小麥生地各一

生薑 石膏各六麻黃三兩甘草一兩大棗十枚 右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

**行義** 氣極傷肺而至喘乏唾血用越婢全方以治旺氣惟恐津血愈傷故加竹葉以清喘之冬地以

滋津血小麥以除臟燥然小麥入於越婢方中則與厚朴麻黃湯中匡佐麻黃石膏發越內動肝風

灸法

嘔吐上氣灸尺澤不三壯則七壯尺澤在腕後肘中橫文 腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上腕下一寸

名太倉七壯

積氣第五 論二首 方五十一首 灸法二十四首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若積在心下腹中疾痛不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即嘔逆惡心熱氣即說物不竟而迫怒氣即上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得息喜氣即積聚在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂氣即不可劇作暮卧不安愁氣即善忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急即四肢肘腫手足拘攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也



七氣丸 烏頭 大黃各七 紫苑 半夏 前胡 細辛 丹參 茯苓 川芎 桃仁明洽作杏仁 葛蒲一作

藥石膏 吳茱萸 桂心 桔梗各三 人參 甘草 防葵各一 乾薑 川椒各半 右二十味為末蜜

丸如梧子大酒服三九日三加至十丸 一方去半夏加甘遂三分胡洽無丹參甘草

七氣丸 主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛

不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀不可當熱痛上澀心

短氣欲絕不得息急氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作臥不安席愁

氣狀平故如怒喜忘四肢附腫不得舉止亦治產後中風餘疾方 大黃半兩 人參 半夏 吳茱萸

柴胡 乾薑 細辛 桔梗 葛蒲各二 茯苓 川芎 甘草 川椒桂一兩 石膏 桃仁各三 右十五

味為末蜜丸如梧子大每服酒下三九日三服漸加至十丸翼方無茯苓川芎甘草石膏桃仁

行義 七氣丸首方雖用參桂薑半甘草之屬以治憂愁喜耗諸氣猶恐辛溫之力不遠不能治寒熱

志怒諸氣所以更加烏茱萸椒辛助大黃防葵以破結桃芎丹菴以和血前結葛苓以散氣石膏一味專

泄旺氣耳其第二方較前用法稍緩不用烏頭防葵之峻力破結裁去紫苑丹參之紆緩粉龐又以柴

胡之升散易前胡之降泄設見筋攣不舉而無大吐嘔逆不妨以桂心之溫血易川椒之下氣未為可

七氣湯 治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力方 乾薑 黃

芩 厚朴各二 半夏 甘草 地黃 芍藥 桔葉根深師作 川椒各二兩 枳實 五枚 人參 一兩

吳茱萸 五合 右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三○又方 治虛冷上氣勞氣等方 半夏

一升 人參 生薑 桂心 甘草各一 右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服日二

行義 湯丸主治有暴欠微甚之分久而劇者非丸無以免應暴而虛者湯液便可宣通七氣湯首

方用椒薑萸半散結人參甘草助氣則與丸方無異若其人素稟血熱則兼芍地以化薑椒之燥芩薑

以清肺胃之熱枳朴以滌內積之氣也 其第二方不用椒萸而用桂心不用乾薑而用生薑以助半



夏人參甘草之力以無標執濁積故不用餘藥所以和劑局方取此以為七氣之法

五膈丸 治憂膈食膈飲膈氣膈勞膈五病同藥服以憂患思慮飲食得之若冷食及生菜便發其病苦

心滿不得氣息引背痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即瘥飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方 麥冬 甘草各五兩 人參 四兩 川椒 遠志 桂心 細辛各三兩 附子一兩

乾薑一兩右九味為末蜜丸微使淳先食含如彈丸一枚細細咽之喉中胸中當熱藥力稍盡復含一

丸日三夜二服藥十日自愈延年方若不能含者可分一大丸作十小丸盡服之夏月宜增麥冬甘草

梧子五兩空腹服之如寒冷則心痛中 有物吐之不出咽之不下食飲少者

行義 噎之與膈本同一氣膈病之始靡不由噎而成原其大槩不外乎鬱故張雞峯以為神思間病

其受病之源非止一端嘗攷五噎之中獨多思噎五膈之中獨多飲膈每見多思慮人每患氣噎經謂

思則氣結是也好熱飲人每患酒膈丹溪謂之死血是也然血膈亦非止一端往往有勇力過甚血菀

於胃阻礙飲食成膈者即如靈樞蟲為下膈亦不過言下膈有此一證若夫命門火衰不能溫養土藏

食時乃出者得非下膈之證乎而素問又有三陽結謂之膈言小腸大腸膀胱之津血俱結如廁澀

難下不通而上逆勢所必然所以五膈丸中不用芩木苓橘之燥而用麥冬上滋肺氣甘草中安胃氣

遠志下通腎氣上下交通何有阻膈之患乎其方雖列肺臟而飲食不下膈塞不通邪在胃脘其間所

用椒辛薑桂附子人參等味却與五噎丸中不異也

治結氣冷癥積在脇下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病方 大蒜去皮三升搗令極熟以水三升和

令調絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁

合得九升所得滓可桃顆大棄之以微火煎取三升下牛乳三升合煮取三升旦起空腹一頓溫服令

盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎 治病癥積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣咳嗽刺風風癰偏風半身不遂腰痠膝冷氣息不塞百



病方

蒜六斤四兩去皮切水淋一升內  
蒜四斗煮取一斗去滓酢蒜汁中牛乳二升 葦莖 胡椒 乾薑各三兩 石蜜 阿魏 戎鹽各二兩 石菖蒲  
木香各一兩 乾胡桃四兩 右十二味為末內蒜汁中以銅器微火煎取一斗空腹酒下一兩五日已上稍

加至三兩二十日覺四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

行義

蒜氣穢濁用以治穢濁之疾同氣相感之用然在葵藿之人為當若素稟清癯者用之反傷清  
純之氣良非所宜 其大蒜煎治諸冷癰否塞百病用椒薑葦莖木香菖蒲胡椒之烈以破積結牛乳

乳酥石蜜戎鹽佐胡桃之潤以化辛烈也

桔梗破氣丸

治氣上下否塞不能息方 桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實 細辛 葦莖各三兩 吳

萸 白朮各六分 胡椒 川椒 烏頭各七 葦莖十分 人參 桂心 附子 茯苓 前胡 防葵 川

芎各五 甘草 大黃 檳榔 當歸各八 右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十丸日三有熱

者空腹服之

行義

上下否塞不能布息故用桔梗橘皮前胡以散痞防葵葦莖大黃以蕩實檳榔枳實厚朴以泄  
滯烏頭附子細辛以破結川椒吳萸胡椒葦莖以下氣乾薑桂心以溫中川芎當歸以和血人參白朮

茯苓甘草以安正氣而助藥力也

檳榔湯

治氣實苦積聚不得食息方 檳榔三七 附子一枚 半夏一升 細辛一兩 乾薑八兩 大黃 紫

苑 柴胡各三 橘皮 甘草 紫蘇各二 茯苓各二 右十二味以水一斗煮取三升分三服相

如人行十里久若有癥結堅實如石加蟹甲三兩防葵二兩氣上加桑皮切二升枳實厚朴各二兩消

息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣丸

行義

金匱大黃附子湯本治寒積脇下偏痛發熱脈緊弦千金參入半夏生薑茯苓甘草橘皮紫蘇  
紫苑柴胡檳榔等味總皆大黃附子細辛三味之輔佐耳

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫所不治復謂是蠱方

檳榔大者四枚 附子一枚



半夏一升 柴胡三兩 生薑八兩 橘皮 甘草 桂心 當歸 枳實略二 右十味 㕮咀以水一斗 煮取三升 分三服 五日一劑 服三劑 永除根本

**行義** 患氣者積氣也 方用薑半 橘皮以散氣 附桂當歸以破血 檳榔枳實以泄滿 柴胡甘草以和諸藥之性也

**半夏湯** 治逆氣心腹滿氣上衝胸脇痛寒冷心腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚方 半夏一升 生薑

桂心略五 橘皮四兩 右四味 㕮咀以水七升 煮取三升 分四服 日三夜一人強者作三服 亦治霍亂後

吐逆腹痛

**行義** 此方專以破氣為主 故於七氣湯中除去人參甘草 易入橘皮以破滯氣 即前治積年患氣中

四味專破血結痰積也

**貝母湯** 治上氣咽喉室塞短氣不得卧腰背痛胸滿不得食面色黃姜方 貝母一兩 生薑五兩 桂心

麻黃 石膏 甘草略二 杏仁三十枚 半夏 右八味 㕮咀以水一斗 煮取三升 分三服 日三

**行義** 咽喉室塞胸滿必是寒鬱熱邪不得發越 故用麻杏甘石加薑半以滌痰涎 桂心以通血脈 貝

母以清肺氣 雖云輔佐實緩麻黃石膏之性耳

**麻黃湯** 治上氣脈浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死方 麻黃八兩 甘草四兩 大棗三十枚 射干

如博基子二枚 右四味 㕮咀以井泉水一斗 煮麻黃三沸 去沫 內藥 煮取四升 分四服 日三夜一

**行義** 於射干麻黃湯中除去生薑半夏細辛五味 紫苑欬冬但加甘草一味 以和中氣也

**奔氣湯** 治天氣上奔胸膈中諸病發時迫滿短氣不得卧劇者便溺欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結

氣方 生薑一斤 半夏 吳萸略一 桂心五兩 人參 甘草各三兩 右六味 㕮咀以水一斗 煮取三升 分

四服

**行義** 此即五味七氣湯加吳萸以降逆氣也



枳實湯 下氣治胸中滿悶方 枳實三枚 附子二枚 大棗十四枚 半夏五兩 人參 甘草 白朮 乾薑

厚朴二兩 右九味以水七升煮取二升半每服八合日三

**行義** 於附子理中湯加枳實厚朴以祛濁痰太棗以通津液

下氣湯 治氣滿腹脹方 半夏一斤 生薑一斤 人參半兩 橘皮三兩 右四味以水七升煮取三升

去滓分三服日三 一方無人參止三味

**行義** 此即大半夏湯去桂心之溫散加人參以助藥力

治氣兩脇滿急風冷方 杏仁 茯苓 防葵各八兩 茱萸 橘皮 桂心 防風 澤瀉各五兩 白朮

射干 芍藥 蘇子 桔梗 枳實各六兩 右十四味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日二加至三十丸

**行義** 風冷攻注兩脇故用杏仁桔梗防風開發於上防葵射干枳實芍藥降泄於下茱萸桂心溫散

於中茯苓澤瀉白朮橘皮分清於內也

黎勒丸 治氣滿閉塞不能食喘息方 詞黎勒十枚為末蜜丸如梧子大食服三丸不忘得利即止

**行義** 金匱治氣痢失氣用詞黎勒粥飲澀以收之千金治氣需喘息用詞黎勒蜜丸潤以飲之蓋得

粥則引入脾經以治痢下氣泄得蜜則引入肺經以治喘息氣上各得引經之妙用耳

治上氣欬逆方 蘇子一升 五味子五合 麻黃 細辛 紫苑 人參 黃芩 甘草各二兩 桂心 當歸

**行義** 於小青龍湯中用當歸以易芍藥生薑以易乾薑加人參以助半夏之運痰蘇子以輔麻黃之

泄氣紫苑以佐細辛之散結黃芩欬生薑之辛散也

治氣上不得臥神秘方 橘皮 生薑 紫蘇 人參 五味子各五兩 方作桔梗 右五味以水七升煮取

三升分三服

**行義** 橘皮生薑紫蘇皆散氣之品得人參五味之固斂不使津隨氣泄乃散中用斂之捷法惟千金



得之

治熱發氣上衝不得息欲死不得卧方

桂心半兩

白石英 麥冬

枳實

白蘚皮

貝母

茯苓

檳榔仁

天冬兩各

車前子二兩

人參

前胡

橘皮

白薇

杏仁兩各

郁李仁三兩

桃仁五分

十七味為末

蜜丸如梧子大

以竹葉飲服十九日

三加至三十九

竹葉飲子

竹葉

蘇子兩各

紫苑

白前兩各

二百部

甘草

生薑兩各

右七味

咀咀以水八升煮取

三升

溫服下前丸藥盡更合

行義

本虛邪實故用桂心石英人參茯苓神天麥二冬固本滋津前杏橘貝白薇白蘚疎肺泄氣檳榔

車前郁李桃仁分調

血氣而順下之

更以竹葉飲子清潤諸味

但加生薑之辛散而下前丸上下開

泄其氣也

人參湯

安食下氣理胸脇并治客熱方

人參

麥冬

乾薑

當歸

茯苓

甘草

五味子

黃

芪

芍藥

枳實兩各

桂心三兩

半夏一升

大棗十五枚

右十三味

咀咀以水九升煮取三升去滓每服

九合從旦至晡令盡皆熱服慎勿冷

行義

方中參芪甘草麥冬五味保元生脈之製也更兼乾薑桂苓枳半大棗理中運痰當歸芍藥以和榮血也

海藻橘皮丸

下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔令咽喉氣悶往來方

海藻

橘皮

白前

杏仁

茯苓

芍藥

桂心五兩

蘇子五合

棗肉

桑白皮

昆布兩各

吳萸

人參

白朮

草薢

右十五味

為末蜜丸如梧子大

飲服十九日二加至十五丸以小便利為度

行義

海藻昆布草薢皆破水滌痰伐腎之猛劑佐以蘇子杏仁橘皮白前桑皮泄肺諸品不得以

參朮黃桂苓芍藥肉安中氣之崩迫也

治氣上方

硝砂

細辛

牛膝

等分

右三味

為末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法



**行義** 氣上而用細辛半斤膝從陰引陽病在上取之下也其硝砂雖有破積攻堅噎膈反胃之治然毒烈不減配礬當是礬砂之誤字蹟相類性味相仿同為柔五金去垢膩噎膈積聚之用但性稍遜而無化人心為血之利害也

治上氣方 上酥一升獨頭蒜五顆右二味先以酥煎蒜蒜黃出之用生薑汁一合共煎令熟空腹溫服一方寸

**行義** 前治結氣冷癥在脇下用蒜汁牛乳此用獨頭蒜乳酥加薑汁以辟臭氣通神明似勝於前與大蒜方中用乳酥乾薑同意

治上氣嘔吐方 芥子二升為末蜜丸寅時以井花水服如梧子七丸日二亦可作散空腹服之及有酒浸服并治臍下絞痛

治勞氣方 小芥子三升搗末絹袋盛酒三斗浸蜜封七日去滓溫服半升漸至一升半酒盡更合忌如藥法

**行義** 芥子辛溫專治脇下及皮裏膜外之痰恐其性暴易散故以蜜丸酒服緩行其勢或搗末酒浸但取氣味不用其滓尤得峻味緩攻之妙

治上氣三十年不瘥方 大棗 杏仁各百粒 鼓一百二十粒 川椒二百粒 右四味先搗杏仁鼓令熟後內大棗椒更搗為丸如棗核大含稍稍咽之日三夜一

**行義** 川椒散冷氣杏仁散結氣香鼓去惡氣大棗和中氣邪氣散而正氣安矣

治積年上氣不瘥垂危者方 芎藭子熟令色變 熟羊肝薄切 右二味各搗等分以七月七日神酢拌令相著夜勿食空腹服二方寸匕須臾拾鍼兩食頃以冷漿白粥二匕止之隔日一服永瘥四十日內得者飯汁作燕菁羹食之已外一切禁斷

**行義** 今世以芎藭根治噎膈反胃取其性走以劫痰垢宿滯然性重陰毒者熟尚能生芽能使痰逆



心竅令人狂惑見鬼不可不慎用羊肝者取其引入血分用酥拌者恐其惑亂神識故取酸收之義  
下氣方 生薑五兩 小麥二升 右二味以水三升煮取一升頓服○又方 大棗十四枚 紫蘇葉切一升

二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得 一方加橘皮半兩肘後無棗

〔衍義〕 生薑散氣小麥安中不使木邪反干肺氣 又方以紫蘇散氣大棗安中與生薑小麥同具散

安之用

治氣方 桃皮二升 去黃者咬咀以水五升煮取三升每服一升瘥止○又方 驢脂二合 酒服日二瘥

止○又方黃牛乳二升 煎取一升和生乳一升空腹服之日二○又方 驢乳初服三合三日後服五

合後至七合七日後至一升忌葵菜猪魚油等○又方 尿空腹服百日即止治一切病○又方 烏

牛尿空腹服日再至三升止

〔衍義〕 桃根皮辟邪散血 驢脂動風以為祛風之嚮導 黃牛乳補虛止渴治噎膈反胃大便燥結

驢乳與牛乳同類兼能滋化風熱 童尿治噎膈火逆上嘔下結 烏牛尿專滌垢膩噎膈脹閉者之

補氣虛逆方 大棗三升 柑皮十具 乾薑二兩 地黃八兩 右四味治下節酒四升漬棗三宿漉出棗取酒為

炊汁將棗內甌中微火蒸令棗膏入釜中酒裏煎酒令至二升許候棗只存皮核乃止火貯器中將前

散及熱下攪令調大略與糖相似酒服二合日再此方非止補氣亦通治一切短氣并形骸羸瘦神良

〔衍義〕 大棗滋潤脾津柑皮利腸中熱毒乾薑治胸滿欬逆地黃治傷中血痺再取柑皮以行大棗之

滯地黃以滋乾薑之烈

大補氣方 地黃五兩 秦椒 甘草各一兩 骨皮 乾薑 昆布各四兩 白朮 桂心 人參 厚朴 海藻

各三兩 羊腎一具 羊肚一具 去骨去骨 右十三味治下節內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度乘熱木臼

合搗取肚腎與藥為一處曝乾更搗為散酒服方寸匕日二

〔衍義〕 陽根於陰補氣必先 血故首取地黃以滋薑桂秦椒之燥以濟參朮甘草厚朴之溫以助羊



壯羊腎之補以化海藻昆布之毒以佐骨皮清解標熱旺氣也

白石英散

明目利小便治氣及補五勞七傷無所不治方

煉成白石英十兩

白石英無多少以鍵子三兩研之

暗黑黃赤者惟取白淨者為佳搗篩礬器中研令極細熟以生絹袋於銅器中水飛盡如作粉法如此三度研洗澄之漸去水水盡至石英礬乾看中有粗惡不淨者去之堪用者更研使熟白絹袋或著礬器中以礬碗蓋之於三斗米下燒之以飯熟訖取出懸之使乾更於礬器中研之為成

右七味治下師總於礬器中研令相得重篩酒服方寸匕日二不得過服慎猪魚鵝鴨蒜冷酢滑

行義

肺氣虛寒已極必需白石英為君佐以茯苓芩綠引領虛陽歸宿下元不使上浮喘其餘石

斛澤瀉茯苓橘皮通解石英之性耳

白石英丸

補養肺氣方

白石英 陽起石

礬石

兔絲子

茯苓

地黃

桔萎根

石斛

白朮

五味子

各二

防風

巴戟

桂心

人參

蛇牀子

牛兩

右十五味

為末

蜜丸

如梧子大

酒下十五丸加至三十丸日二服

行義

方中礬石專解石英陽起石之悍悍地黃專助兔絲茯苓之滋精防風專鼓人參白朮之益氣

石斛專輔巴戟之強陰桔萎根專化桂心之辛熱五味子專收蛇牀之燥烈用藥之奧全在配合得宜

不可拘於藥性或隨佐使或相反激或用和解或寒因寒用熱因熱用或補中寓瀉瀉中寓補或寒熱

文錯補瀉雜陳種種各具至理非熟擅金匱千金之法者難以語此

補傷散

治肺傷善泄欬善驚恐不能動筋不可遠行膝不可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引

胸中卧不安席忽忽喜夢寒熱小便赤黃目不能遠視唾血方

天冬

一升

防風

澤瀉

人參

阿

膠

各一

桔萎根

前胡

芍藥

石膏

乾薑

大豆卷

各二

紫苑

白薇

各一

桂心

白朮

各四

地

黃

甘草

山藥

當歸

各二

右十九味

治下師

食前酒服

方寸匕日三

行義

此金匱薯蕷丸之變方除一十三味相同外其天冬乃麥冬之變味柴胡乃前胡之變味澤瀉

乃茯苓之變味桔萎根乃杏仁之變味石膏乃桔梗之變味紫苑乃川芎之變味惟薤白二味無可變



味裁汰未為不可

理氣丸 治氣不足方 杏仁 桂心略 乾薑 益智仁略 二右四味為末蜜丸如梧子未食服三丸

以知為度

**行義** 理者補不足而損有餘也杏仁散肺氣桂心助肝氣乾薑溫脾氣益智收腎氣補火以生土也

治冷氣氣短方 蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

**行義** 蜀椒溫中下氣能使遊火下達命門而本經治救逆不獨主下氣也以其性秉五行氣平能升

味厚能降周身上下無所不至一切虛寒逆之無不宜之

治讀誦勞極疲乏困頓方 酥油 酒 白蜜略 二合銅器中微火煎二十沸下之為準七日七夜服

令令盡宜慎生冷○又方 人參 甘草 茯苓 當歸各二兩 芍藥 地黃 黃芪 骨皮各

兩大棗各二十 右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服 一方桂心三兩

**行義** 誦讀過勞氣傷聲瘡但需滋其氣道聲音自復方後垂戒宜慎生冷者恐其閉遏清陽之氣耳

若其人本元素虧又當從事參芪甘草以保元芎歸芍地以活血茯苓骨皮以清火大棗以滋脾家之

津液也

治平短氣方 搗韭汁服一升立瘥肘後方治平上氣喘急便欲死

治乏氣方 生薑 枸杞葉各二兩 右二味咬咀以水三升煮取一升頓服

治年少房多短氣方 豉七合 梔子枚十四 右二味以水二升煮取豉一升半去豉內梔子煮取八合服半升

不瘥更服

**行義** 死血留泊於肺胃而卒然短氣者用生韭汁之辛以散之 暴寒襲於會膈而卒然氣乏聲啞

者生薑汁之辛兼枸杞葉之苦以散之 少年房多短氣虛火上浮者取豉下通腎氣梔子上散虛陽

若病人舊有微瘡者則長沙有不可用之之戒設或腎中真陽素虧而喘息短氣又當從事辛溫納氣



歸元之法矣

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止○上氣厥逆灸胸  
 膈百壯穴在兩乳間 胸膈中氣灸關膈百壯病鶴云第四椎下兩旁各一寸半名關膈 心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒  
 冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄利灸太倉百壯太倉一名胃募在心下四寸乃胃脘下一寸是 結氣囊裏鍼藥所不及灸  
 胃募隨年壯胃募二穴從乳頭度至臍中屈去半從乳下行度頭是穴 下氣灸肺膈百壯 又灸太衝  
 五十壯 臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣也灸關元百壯穴在臍下三寸 短氣不得語灸天井  
 百壯穴在肘後兩筋間 又灸大椎隨年壯 又灸肝膈百壯 又灸尺澤百壯 又灸小指第四指間  
 交脈上七壯 又灸手十指頭合十壯 少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯 又鹽灸臍孔中二七壯  
 之氣灸第五椎下隨年壯 論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿淹淹欲絕此為奔豚氣急作湯以  
 浸兩手足數數易之 奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半 又灸關元百壯穴在臍下三寸 奔豚灸  
 期門百壯穴直兩乳下第一脇端傍一寸五分 奔豚腹腫灸章門百壯章門一名長平穴在大橫外直  
 臍季脇端 奔豚腹腫不得息灸中極五十壯中極二名玉泉穴在臍下四寸 奔豚上下腹中與腰相  
 引痛灸中府百壯穴在乳下三肋間 奔豚上下灸四滿二七壯穴俠丹田兩傍相去三寸即心下八寸  
 臍下橫文是也

肺痿第六 論一首 方四首

論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦  
 因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便便利數或從便難數被駛藥下重亡津液故得肺痿又寸  
 口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦踈澀入而不出陰脈不澀身體反冷其內反煩多唾唇燥  
 小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜下如豚腦但坐發汗故也其病欬欬不得效教出乾沫久欠小



便不利其脈平弱肺痿唾涎沫而不效者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

甘草乾薑湯 溫臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴若渴者屬消渴症不效上虛下不能制漫方 甘草

草四兩乾薑二兩右二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分二服服此湯已小溫覆之集驗肘後有

大棗十二枚

甘草湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方濕方名甘草二兩咬咀以水三升煮取一升半取滓分

三服

行義 金匱云熱在上焦因欬而為肺痿又云肺痿吐涎沫而欬瘕其人不渴必遺尿小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯溫之方用炙甘草溫肺兼乾薑以搜逐

寒涎也 若心下溫溫液液欲吐不吐單用甘草一味溫補肺絡寒涎不煩乾薑搜逐之力服甘草乾

薑湯渴者屬消渴又當從白虎加人參例治也

生薑甘草湯 治肺痿欬吐涎沫不止咽燥而渴方 生薑五兩甘草四兩人參三兩大棗枚十二右四味

咬咀以水七升煮取三升去滓分三服

行義 肺痿日久胃氣并虛雖用甘草不得人參協助之力無以建溫肺之功且津氣既衰不能勝乾

薑之燥故易生薑散肺之結佐以大棗運脾之津土沃金生虛則補其母上皆屬寒主治若屬熱者則

有炙甘草湯麥門冬湯白虎加人參湯等法在三隅之反智者自能領悟也

麻黃湯 治肺脹欬而上氣咽燥而喘脈浮者心下有水方 麻黃 芍藥 生薑仲景用細辛桂心

各三兩半夏五兩五味子各半兩石膏四兩右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服仲景名小青龍加石膏湯用甘草二兩為九味

行義 肺脹皆屬邪實非若肺痿雖有寒熱之分從無實熱之例金匱有云上氣而燥者屬肺脹欬作風

水發汗則愈其治原有越婢加半夏湯小青龍加石膏湯兩方千金麻黃湯即小青龍加石膏湯因集

水發汗則愈其治原有越婢加半夏湯小青龍加石膏湯兩方千金麻黃湯即小青龍加石膏湯因集

水發汗則愈其治原有越婢加半夏湯小青龍加石膏湯兩方千金麻黃湯即小青龍加石膏湯因集



方時偶失遺甘草一味後世不敢擅補庸師不知誤失相傳至今不改如初蓋小青龍石膏中藏越婢之法越婢加半夏中藏小青龍之法方中甘草皆不可缺乃治風水之方不獨發汗并祛肺中涎水蘊熱全在牛夏石膏輔佐麻芍桂辛之力耳

肺癰第七論一首 方六首

論曰病欬吐膿血其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為肺寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁米時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫所不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為肺癰其脈數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯 治欬胸中滿而振寒脈數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥是為肺癰方 桔梗三兩 集驗方用二兩古

欬冬花一兩半

行義

肺癰初起欬唾臭痰用桔梗以清肺氣利咽喉甘草去咽痛解熱毒金匱始萌可救之法也

瀉肺湯 治肺癰喘不得卧方 葶藶三兩 大棗二十

右二味咬咀以水三升先煮棗取二升去棗內葶

蘆二方寸匕煮取七合頓服令盡三日服一劑可至三四劑治肺癰胸脇脹一身面目浮腫鼻塞涕

出不聞香臭欬逆上氣喘鳴迫塞宜先進小青龍湯却服前藥其小青龍湯方見

行義

肺癰已成吐如米粥濁垢壅遏清氣之道所以喘不得卧鼻塞不聞香臭故用葶藶破水瀉肺



大棗發脾通津乃瀉肺而不傷脾之法保全母氣以為向後復長肺葉之根本然肺胃素虛者薑蘆亦難輕試不可不慎

皂莢丸 治肺癰初起欬逆上氣時時濁唾但坐不得臥方 皂莢八兩為末蜜丸如梧子大以棗膏和

湯服三九日三服夜一服

必效方以酥炙皂莢

**行義** 此肺癰滌除痰垢之方皂莢辛鹹力專去風拔毒通關利竅破積攻堅之峻藥酥炙蜜丸潤其燥烈服用棗膏和湯通達脾津然惟肥盛之人肥痰支塞於竅絡始萌可救者為宜若潰後膿過泄血及元氣瘠薄之人難勝搜剔者未可輕試所以千金更立薑蘆湯黃昏湯等方以補金匱之未逮

黃昏湯 治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰者方 黃昏手掌大一塊是合歡皮也咬咀以三升煮取一升分二服

**行義** 合歡屬土與水補陰之功最捷其幹相著即粘合不解故治肺癰潰後長肺之要藥一名合昏

又名黃昏寧無顧名思義之意存焉

薑蘆湯方 薑苈仁 瓜瓣各半 桃仁五十枚 薑蘆切二升水二斗煮取五升去滓 右四味咬咀內薑汁煮取二升服一升

當有所見吐膿血

**行義** 薑苈下氣利水本經治肺急拘攣不可屈伸能清脾濕祛肺熱所以虛勞欬嗽肺痿肺癰虛火

上乘皆取以為下引之味但性專利水津氣受傷者服之每致燥渴不若取其根一味搗汁熱飲三合連飲三五次不拘癰之已潰未潰服之最捷甜瓜瓣專於開痰別錄治腹內結聚破潰膿血善逐垢膩而不傷伐正氣為腸胃內癰要藥桃仁治瘀血血閉性專下走而無上逆之虞薑蘆專通肺胃結氣能使熱毒從小便泄去以其中空善達諸竅用薑而不用根本乎天者親上也

桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺癰吐涎沫不止方 桂枝 生薑各三兩 甘草二兩 皂莢一兩 大棗十五枚 右

五味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服



**行義** 桂枝湯和榮衛藥千金去芍藥之酸收參入皂莢一味即金匱皂莢丸不用蜜丸而入湯液然不若用湯送丸不使皂莢之味棘喉尤為得宜此惟肥盛多濕濁垢支塞肺胃者方為合劑若瘦人津液素稠雖有痰血亦難勝皂莢之蕩滌也 此方向列肺痿例中因世本方中刊作肺痿吐涎沫乃魯魚之誤今力正之

飛尸鬼症第八論一首 方四十二首 灸法十四首

論曰凡諸心腹痛服眾方熱藥入腹寂然不動但益氣息急者此尸症病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

**五症湯** 治卒中賊風遺尸鬼邪心腹刺痛大脹急方 大黃 甘草 各三兩 當歸 芍藥 各二兩 烏頭 十枚 桂心 四兩 生薑 蜜 各一石 八味 吹咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升和

湯中去滓分服三合如人行三十里久更進一服日三不知加至四合

**行義** 賊風五症之邪心腹刺痛服急服熱藥寂然不動但氣息反急者以其氣逆上衝必干于肺所以千金類附此門宜先服甘草湯者取其解毒也少頃服瞿麥湯者取其利小便也本經謂瞿麥能出刺極言逐邪拔毒之速也五症湯中用烏頭薑桂辛烈祛辟陰邪即兼歸芍護持營血甘草蜂蜜解毒安中除邪養正之大略也

**蜈蚣湯** 治惡症邪氣桂來心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩痛羸乏短氣方 蜈蚣 一枚 牛黃 一分 丹砂 人參 各三兩 大黃 二兩 鬼白 細辛 當歸 桂心 乾薑 各一兩 黃芩 麝香 各半兩 附子 四枚 右十三味吹咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝香末分三服

**行義** 方中丹砂牛黃麝香鬼白辟邪即用參附薑桂安正大黃黃芩開泄熱毒之去路也

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時搶心脇滿脇痛如刀刺口噤者方 吳茱萸 桂心 芍藥 各二兩 乾地黄 乾薑 茯苓 甘草 細辛 當歸 羊脂 各一兩 梔子仁 枚 右十一味



吹咀以水八升煮取三升去滓內脂烱盡分三服欲利者加大黃三兩

**行義** 方中藥味與前後諸方相類惟羊脂治賊風痿痺去經絡熱毒突出意表

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛方 乾地黄 芎藭 當歸 茯苓 甘草 各一芍藥  
吳茱萸 桂心 乾薑 各二 梔子仁 一枚 右十味吹咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加羊脂二

**行義**

卒中惡風角弓張首用地黃兼芎歸芍藥以解血脈中之熱毒養血榮筋治風先治血也

桃皮湯 治中惡氣心腹痛胸脇脹滿方 桃白皮 引一種東 真珠 附子 各一 梔子仁 當歸 三兩 吳茱

已下四味

桃奴湯 治中惡諸尸蠱症心腹卒絞痛方 桃奴 人參 當歸 乾薑 各二 芎藭 甘草 各三 桂心

茯苓 鬼箭羽 犀角 丹砂 麝香 各一 右十二味吹咀以水九升煮取二升半去滓分二服大便

不通腹滿加大黃三兩芒硝二兩 胡洽無丹砂

**行義**

桃皮湯取桃根白皮辟邪散血真珠鎮心安神以佐黃附辛溫散結梔鼓分解旺氣也 桃奴

湯中專取桃奴殺鬼精物鬼箭羽破血除風其間乾薑即前方黃附之意犀角即梔鼓之意桂心當歸

散血溫經之用則一其餘諸味可以意推

治卒中風寒冷溫氣入腹臌脹急滿搶心胸脇久痛氣息不通脈弦緊汗不出及傷寒方 吳茱萸 當

歸 麻黃 獨活 甘草 桔梗 茯苓 各二 桂心 青木香 大黃 石膏 各三 犀角 右十二味

吹咀以水一斗煮取三升分三服日三

治風冷入腹急絞痛緊急如吹大小便閉小腹有氣結如斗大脹滿其脈弦緊或沉遲者方 瞿麥 當

歸 鬼箭羽 猪苓 桔梗 吳茱萸 海藻 川芎 防己 各二 桂心 大黃 各三 一方有犀角 二



右十二味以水九升煮取三升分三服

**行義** 卒中風寒時行溫氣入腹用麻黃大黃石膏犀角等味分逐中外諸邪風冷入腹專用瞿麥

黃桂心海藻防己大黃祛邪內泄也

治諸雜症相連續死及治三十年眾症方 桃根白皮一斤咬咀以水二斗煮取一斗去滓分八九服須

令二日服盡崔氏用桃根白皮治○又方 桃仁十四枚搗研酒服○又方 小芥子末雞子白和傅

尸症鬼症者即五尸之中尺症又挾諸鬼邪為害也其變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱

淋瀝沉沉默默不得知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復症易傍人乃至滅

門覺如此候者宜急療之方 獾肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具不瘥更作

**行義** 桃根白皮取其辟邪 桃仁取其散血 芥子入肺利氣豁痰兼有辟惡之功 獾肝專殺瘵

蟲兼療瘵瘵

小附著散 治飛尸賊風發時急痛不在一處鍼之則移發一日半日乃瘥須臾復發者方 細辛 天

雄 甘草各一分 桂心三分 烏頭 附子 乾薑各一真珠 雄黃各半 右九味治下篩酒服方寸

不知稍增以知為度胡洽不用桂心附子有椒蜀四分

大附著散 治五尸症忤與前狀同者方 天雄 桂心各半 細辛 乾薑 雄黃 黃芩 黃連 由

跋 椒目各一金牙 犀角 麝香 牛黃各一真珠 三分 蜈蚣 一 右十五味治下篩酒服一錢匕

日三服以知為度

**行義** 方中一脈辛烈辟除邪毒之藥獨取真珠以安神識甘草以和胃氣 大附著散中天雄雄黃

金牙由跋蜈蚣麝香牛黃犀角無所不具專取苓連以清邪熱惡毒也

後金牙散 治鬼症風邪鬼語尸症或在腰脊胸脇流無常處不喜見人志意不定而脫色目赤鼻張

乾甲黃者方 金牙 雄黃 鐵精 曾青 珍珠 丹砂 野葛 芫蕒 露蜂房 大黃 甘草



蛇蛻皮 蘭茹 乾漆各一石 長生 狸骨各一石 鬼前羽 桔梗 烏頭 鬼督郵 椒目

狼毒 蕪荑 藜蘆 雷丸 芫菁 滑石各二石 毒公 鱉甲 牛黃 人參 胡燕屎 狼毒

桂心各四 寒水石 蜈蚣 蜥蜴 附子各一 蜣螂 亭長各一 石膏五分 徐長卿 斑貓各十 貝母

二枚 右四十五味治下節先食以酒服一刀圭日二不知漸加之蟲隨大小便出金氏名蜀

行義 行義附見前十二卷臍臍門大金牙散下

前大金牙散 治一切症病方見十二卷臍臍門

白朮散 治風入臍臍門絕常自躁痛或風症入身冷症鬼症飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內

或外鍼灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便

有血小便赤黃房中勞極方 白朮十四枝 附子 秦光 人參 牡蠣 蜀椒 細辛 黃芩 川芎

牛膝各三 乾薑 桂心 防風各五 獨活 柴胡 桔梗 茯苓 當歸各四 烏頭 天雄 甘草

莽草 麻黃 石南 杜仲 桔萋根各二 右二十六味治下節平旦酒服五分七訖如人行七里久

勢欲解更飲酒五合為佳

太乙備急散 治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼症及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病

六七日方 雄黃 桂心 芫元各二 升砂 蜀椒各一 藜蘆 巴豆各一 野葛三分 附子五分 右九

味巴豆別研如脂餘合治下節以巴豆合相更搗置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五匕可加至

一錢匕老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢當汗出此所謂如湯沃雪手下皆愈方

宜秘之非腎不傳

龍牙散 治百症邪鬼飛尸萬病方 龍牙 茯苓各二 雄黃 芍藥 藜蘆各五 乾地黄 石斛 胡

燕屎各三 鬼箭羽 烏頭 羌活 靈蜂房 曾青 珍珠 桂心 杏仁 防風 桃奴 鬼白

鵝骨各一 人參 大黃各一 白朮 二兩 蘇子 四合 橘皮 甘草 川芎 遠志 鱉甲 鬼督郵 銅

方 卷之六



鏡鼻各半狸陰二具 蜈蚣一枚 右三十三味治下節酒服一刀圭以知為度當有蟲從大便出

**行義** 諸症方中惟此因房中勞極故用法稍平雖有麻草莽草烏附天雄之毒劣然得參苓歸芍等

味涵養血氣不致大傷元氣也 太乙備急散彙集花柳藥野萬巴豆之毒方濟以丹砂雄黃蜀椒

桂附亦是峻銳之伍 龍牙散中鵝骨狐陰雄黃曾青烏頭三鬼辟邪攻毒之味無不畢宜為百症萬

病之類治也

治鬼症蠱症毒氣變化無常處方 犀角 麝香 丹砂 雄黃 鹿角 龍骨 鮫魚皮 蜈蚣 丁

香 藁荷根 蜀椒 乾薑 一貝子十枚 右三十三味治下節酒服方寸匕加至二七日三

**行義** 方中丹砂雄黃鮫皮貝子之屬皆症病之治獨藁荷專為蠱毒而設

備急丸 治卒中惡風氣忤迷絕不知人方見前第十二卷膽脾門中

墨奴散 治卒得惡症腹脹方 釜下墨一合 鹽二合 右二味合治以水一升半煮取八合一服令盡須

史吐下即瘥

治暴心痛面無顏色欲死者方 以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中稍服之利即愈

治哭症方 梳齒間刮取垢水服之 又方 亂髮一兩 臘月猪脂二合 右二味取猪脂煎髮消烱服之

蟲死矣 又方 熬大豆帛裹熨之

治一切病食症方凡食上百病為食症 取釜下土如雞子大為末酢酒清一升和服之行五十步吐即瘥 又方

還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如杏仁大水服之

**行義** 墨奴散用釜墨之同氣相引得鹽之鹹而涌之上泄也 暴心痛面無顏色火氣上逆可知但

需燒鹽酒服以抑之下泄也 哭症是火燥金家肺絡中為涎垢所積故用梳齒間垢水服取吐以泄

火毒 猪脂髮灰金匱名猪膏髮煎治瘀血發黃陰吹正瞑等疾取其能破血通津也 入豆熬熟裹

熨取其溫暖散氣 食症因飽食以受邪食滯膈上故曰食症用釜月下土醋服取吐在上者因而越



之也 又方以所食之物燒末服之以消化所傷之物此惟最重之人宜之

鶴骨丸 治飛尸遁尸積聚胸痛連背走無常處或在臟或腫在腹或奄奄然而痛者方 鶴骨 三寸丹

砂 一作牡蠣 雄黃 莽草 各四 藜蘆 桂心 野葛 各二 蟬蛻 羌青 各十 蜈蚣 巴豆 各十

右十二味為末蜜丸如小豆每服二丸日三以知為度

行義 鶴善噉蛇故其骨能療尸症更以蟬蛻羌青莽草藜蘆蜈蚣野葛等味入一方以毒攻毒

蜥蜴丸 治癰堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸症骨血相注惡氣鬼忤蛇毒邪氣往來夢寐存亡留飲結

積虎狼所噴獠犬所咋鳩毒八人五臟服藥以殺其毒毒即消婦人邪氣鬼忤亦能遣之方 方見前

春肝臟門

桔梗丸 治毒症鬼症食症痰飲宿食不消酒癖諸病方 桔梗 藜蘆 皂莢 巴豆 附子 各二

右五味為末蜜和搗萬杵丸如梧子大宿不食平旦飲服二丸仰臥服勿眠至食時膈上吐腸腸下去惡

物如蜥蜴蝦蟆子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升三四日病未盡

更服忌如藥法

行義 桔梗皂莢藜蘆涌吐巴豆攻下附子以奮諸藥之力也

十症丸 治十種症氣症勞症鬼症冷症人症死人症尸症食症水症土症等方 雄黃 巴豆 各二

參 甘草 麥門冬 細辛 一作桔梗 附子 皂莢 蜀椒 各一 右十味為末蜜丸如梧子空心服

五丸日二稍加以知為度

行義 十症丸取桔梗丸中四味不用藜蘆而用雄黃細辛蜀椒之辛烈辟邪且得參甘草麥冬雖

云助長辛烈之性究竟良藥可保護津氣不似桔梗丸之一派峻銳耳

太乙神明臨冰丸 治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼症長病欬逆唾噫辟除眾惡鬼逐邪氣鬼擊客忤

中惡胸中結氣咽喉閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之跳手心中溫溫如有蟲狀毒症相染甚



至減門者方 雄黃二兩當歸三兩丹砂 熨石一作桂心 大黃各二兩 芫青五枚 藜蘆 附子各一兩半

人參 珍珠 麝香 鬼白 犀角 牛黃各一兩 蜈蚣一枚 射罔一兩 烏頭八枚 杏仁三十枚 蜥蜴一枚

穉雞 地膽各七枚 蟬蛻七枚 巴豆一分 右二十四味為末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食服二九日再

不知稍增又以二九著門上令眾邪不近如傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二九

眾邪不能近也胡洽無桂心芫青人參珍珠犀角麝香射罔牛黃蜥蜴烏頭穉雞當歸十二味藥

**行義** 陷冰為名者毒邪得藥如冰泮渙也方中二十四味除人參丹砂犀角珍珠餘皆大毒大劣上

吐下泄之味允為辟除邪固之用也

江南度世丸 治萬病癥堅積聚伏尸長病寒熱瘧疾氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不

食傷寒時氣惡症汗出口噤不開心痛方 蜀椒三兩 人參 細辛 甘草各兩 茯苓 珍珠 大黃

乾薑 丹砂 野葛 桂心 雄黃 麝香 鬼白各一兩 烏頭 牛黃各二兩 附子 紫菀各六兩 巴豆十枚

蜈蚣二枚 右二十味為末蜜丸如小豆飲服二九加至四九日二服加獾肝一具更良

大度世丸 治萬病與前狀同者方 牛黃 大黃 雄黃 珍珠 丹砂 人參 附子 細辛 甘

草 射罔 鬼白 莽草各一兩 蜀椒 麝香 鬼箭羽 桂心 茯苓 紫菀各二兩 乾薑三兩 野葛兩

蜥蜴 蜈蚣各一兩 地膽五小 芫青十枚 穉雞三十枚 巴豆十枚 右二十六味為末蜜丸如小豆大飲服二

九日二先食服之

**行義** 度世而分江南見南方風氣柔弱不勝猛劇峻攻不似大度世丸之毒烈倍甚也 大度世丸

中射罔莽草蜥蜴芫青穉雞無不畢具其迅劣之威與陷冰丸不相上下也

治症病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方 獾肝一具 蜈蚣一枚 麝香二分 雄黃 莽草 丹砂

鬼白 犀角 大黃 巴豆 牛黃各一兩 右十一味為末蜜丸如麻子空腹服二九至三九以知為度

**行義** 瘵症傳染雖有雄黃巴豆鬼白莽草牛黃麝香不用獾肝不能使傳尸瘵瘵絕跡也



雷氏千金丸 治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺及瘧方 硝石三分 大黃五分 桂心 乾薑

各二 巴豆仁 六十 右五味為末搗三千杵蜜丸如大豆服二丸神驗無比已死者折齒灌之

行義 於三物備急丸中更多硝石桂心二味以破積堅之邪乃三皇時古方也

治卒得尸瘧毒痛往來方 杏仁 亂髮灰 等分 右二味研如脂丸如梧子每服酒下三丸日三 猪膏和

治道尸尸瘧心腹刺痛不可忍方 桂心 乾薑 各一 巴豆仁 二兩 右三味治下篩以上醋和如泥傅

病上乾即易之

治道尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方 白芥子一升蒸熟搗以黃丹二兩攪和分作兩分用球

布袋盛更蒸使熟薄痛上當更迭蒸袋常使熟薄之如此三五次即定

治人皮膚中痛苦名癰瘡方 醋和燕窠土傅之

治走瘧方 燒車缸令熟暫入水以濕布裏慰痛上

治三十年氣瘧方 豉心 半升 生椒 一合 右二味以水二升煮取半升適寒溫用竹筒吸取汁令病者側

卧半摩大孔射灌之少時當出惡物此法垂危悉得治瘧百千不可具說

行義 卒得死瘧邪未深入但用杏仁以泄滯氣髮灰以散結血 道尸尸瘧心腹刺痛皆陰毒為患

故於備急丸中陰去大黃之純陰易入桂心助陽醋和傅痛處以破陰邪之秘拒 屍瘧心痛不似心

腹刺痛之勢劇故以艾鋪執熨取純陽之火以散陰毒之邪耳 芥子祛痰黃丹拔毒二物蒸熨使熱

氣內達以散結積之毒 皮膚中痛風濕原來深入但取燕泥醋和以收其邪可無藉於湯藥 痛而

走瘧風火之象故以車缸燒熨取其流動之意耳 豉解惡毒椒散結氣從上而引濁惡下泄魄門亦

肺與大腸之竅也

灸法



凡五尸者飛尸遁尸風尸沉尸尸症也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或塊壘踊起或牽引腰背治之之法灸乳後三寸男左女右可二十七壯不止者多其壯數取愈止又灸兩手大拇指頭各七壯又灸心下三寸十壯又灸乳下一寸隨病左右多壯數又以細繩量患人兩乳頭內卽裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋罅於繩頭灸三壯或七壯男左女右卒症忤攻心胸灸第七椎隨年壯又灸心下一寸三壯又灸手肘文隨年壯一切病食症灸手小指頭隨年壯男左女右五毒症不能飲食百病灸心下三寸胃脘七壯水症而中經云肺來乘腎食後吐水灸肺膺又灸三陰交又灸期門穴在乳下二肋間瀉肺補腎也各隨年壯一切症無新久先仰臥灸兩乳邊斜下三寸第三肋間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名瘕市



大腸腑方凡七類

大腸腑脈論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺含氣於大腸大腸者為行道傳瀉之腑也號監倉豫重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升至十二時定血脈和利精神行金明堂外臺同難經云長二丈一尺六寸鼻逆以長以候大腸 右手關前寸口陽絕者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節即欬刺手太陽治陰在魚際間 右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如鍼刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之 大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉 腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺膏之原巨虛上廉三里 大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化 大腸有寒驚瀉有熱使腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀 肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺矢便利厥氣客於大腸則夢田野 肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結 偏鵠曰手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則脹滿不通口為生瘡食不入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿全實全虛年來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於腸氣水根在大腸材觀始大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死手陽明之脈起於大指次指之端循指外側上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直上上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病齒痛頸腫是主津所生病者目黃口乾鼻衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復感



者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

大腸虛實第二脈二首 方二首

大腸實熱 右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名

曰大腸實熱也

生薑泄腸湯 治大腸實熱腹脹不通口為生瘡者方 生薑 橘皮 青竹茹 白朮 黃芩 梔子

仁略三桂心一兩 茯苓 芒硝略二地黃略十兩大棗略十四 右十一味以水七升煮取三升去滓

下芒硝分二服

衍義 本經言生薑久服去臭氣通神明故千金以之泄大腸之實熱兼大棗以治心腹邪氣安中養

脾平胃氣通九竅橘皮下氣通神竹茹黃芩梔子清上熱口瘡地黃芒硝治傷中逐血痺除邪熱通脹

閉其襄推陳致新之功白朮茯苓保守中氣以助諸藥之力桂心為祛熱之內應也

治腸中腫脹不消方 灸大腸腧四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿使臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷 右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴唇乾口急善驚泄白名

曰大腸虛冷也

黃連補腸湯 治大腸虛冷利下青白腸中雷鳴相逐方 黃連四兩 茯苓 芍藥略三地榆五兩 酸石

榴皮五片 伏龍肝雞子大 右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

衍義 方下雖言大腸虛冷利下青白然腸中雷鳴火激痰動與生薑瀉心湯之用芍連佐乾生二薑

同意此用黃連佐榴皮伏龍肝得寒熱相參之妙榴皮酸澀茯苓利之芍藥地榆佐榴皮以理血脫方

下雖不治血而治血之義具見言外矣 治腸中雷鳴相逐痢下方 灸承滿五十壯穴在俠巨關相去五寸巨關在心下一寸灸之者俠巨關



治腸中常鳴時上衝心方 灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便秘節小便赤黃腸綱主之 腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫快臍急天樞主之 腸鳴而痛溫留主之

### 肛門論第三論一首

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令吏重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若臍傷寒則肛門開大行洞泄肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調理 方見二十四卷中

### 皮膚實第四論二首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮膚毛膚肉若病從外生則皮膚毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓痛疼兼陰陽表裏內髓外皮其病源不可不詳之也皮膚虛者寒皮膚實者熱凡皮膚虛實之應主於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

薤白湯

治皮膚虛主大腸病寒氣關格方

薤白根葉切

三菖蒲葉切

二桃葉皮枝

二升細糠

一斗秫

米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯於盆上作一小竹牀子置盆人坐床中

周回四面將薦薦障風身上以衣被蓋覆若欲氣息時開孔對中洩氣取通身接汗可得兩食之許如此三日蒸還溫藥足汁用之若益重不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉治之

衍義

薤白治寒痺拘急菖蒲通利九竅桃葉辟邪散血糠米蒸發肉腠共襄作汗之功也

梔子煎

治皮膚實主肺病熱氣方

梔子仁

枳實

太青

杏仁

柴胡

芒硝

生地黄

淡竹

葉切

各生元參

五兩石膏八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

衍義

肺主皮毛肺熱則皮膚實故用梔子杏仁柴胡元參竹葉治外熱石膏芒硝大青地黃枳實治內



實

欬嗽第五

論二首 方五十五  
灸法十四首

論曰經云五臟六腑皆令欬肺居外而迎上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰引肩背甚者不得動動則咳劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔嘔甚則長蟲出久咳不已三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不能飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也若順時有風寒令人觸胃解脫傷皮毛間入肺臟為欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇支痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汁出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有股欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證以何為異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則肢痛其脈反遲謂之股欬欬則引脇下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引小腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不下之寒欬股欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵 夫久欬為痰欬而時發熱脈在九菽一拊者非虛也此為胸中寒實所致也當吐之 夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐耳欬家其人脈弦為有水可與十棗湯下之 凡下第不能吐欬者陰不受邪故也留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬者如小兒驚風狀夫酒家欬者必欬吐血此坐之極飲過度所致也其脈沉者



不可發汗久嗽數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必喜胃其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得卧者死寒家欬而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散散者為氣實而血虛名曰有表無裏上氣面胸腫肩息其脈浮大不治如痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

小青龍湯 治咳逆倚息不得卧方 觀第上卷 小青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣

從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰腹小便難時復胃者與桂苓五味甘草湯治其氣衝方 茯苓四兩 桂心 甘草 兩各二 五味子 半升 右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫分

三服 衝氣即低而反更咳胸滿者苓甘五味薑辛湯以治其咳滿方 茯苓 四兩 甘草 乾薑 細辛 各三

五味子 半升 右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三 咳滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當逆渴而渴反止者為支飲也支飲法當

冒胃者必嘔嘔者復內半夏以去其水桂苓五味甘草去桂加薑辛半夏湯方 半夏 五味子 各半 茯苓 四兩 細辛 乾薑 甘草 兩各二 右六味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人逆痺故不內麻黃內杏仁茯苓五味加薑辛半夏杏仁湯方 杏仁 半夏 五味子 各半 茯苓 四兩 細辛 乾薑 甘草 兩各三 右七味㕮咀以水一斗煮取三

升去滓溫服半升日三若逆而內麻黃其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也 若面熱如醉此為胃熱上衝黃其面加大黃利之苓甘五味加薑辛半夏大黃湯方 大黃 細辛 乾

薑 甘草 兩各三 茯苓 四兩 杏仁 半夏 五味子 各半 右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓溫服 半升日三

衍義

小青龍湯余於傷寒門中大青龍條下具言之矣而金匱治咳叙於痰飲之下趙以德衍義論



之最詳以咳必因之痰飲而五飲之中膈上支飲最爲咳嗽根蒂外邪入而含之因咳即無外邪而支飲漬入肺中自足令人咳嗽不已況支飲久蓄膈上其下焦之氣逆衝而上尤易上下合邪也夫以支飲之故而令外邪可內下邪可上不去支飲則咳終無寧宇矣其曰咳逆倚息不得卧小青龍湯主之明外內合邪之證惟小青龍湯爲的對且能用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上重增濁亂其咳不能堪矣傷寒用小青龍湯無少陰證者可服雜證用小青龍湯亦恐少陰腎氣素虛衝任之火易於逆上衝任火上無咳且增煩咳況久咳不已顧可動其衝氣耶蓋衝任二脈與腎絡同出胞中腎虛不能固守於下二脈相挾從小腹逆衝而上也腎氣本虛之人即素無痰飲纔感外邪則衝任之火使乘勢上填膈上迫腸津液而爲痰飲支寒清道必致咳逆倚息不得卧也倚息本倚伏而喘息陰火內應外邪爲證最急不得不以小青龍湯爲粉祇緣真元素虧總有合劑不能遲延掃之力所以餘邪得以久持致有如下變證也 多唾飲上溢也口燥津液傷也寸脈沉尺脈微手足逆冷衝中陽氣耗也氣從小腹上衝胸咽陰火逆也手足痺寒血虛也其面赤熱如醉陽明胃熱也因復下流陰股小使難陰火下流膀胱也時復胃太陽餘邪未散也然證雖屢變皆衝氣逆上之故且有時復冒胃一證即定太陽表證確守胃家汗出自愈之例故反覆出入不離小青龍湯加減也設證多端衝氣最爲巨測所以首變茯苓桂心五味甘草湯先治衝氣衝氣即低而反更咳胸滿水在膈間不散也再變前方加乾薑細辛以治其咳滿咳滿即止 第二變而更復渴衝氣復發以細辛乾薑爲熱藥也服之當逆渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒胃者必嘔嘔者復內半夏以去其水水去嘔止 第四變其人形腫者以水尚在表也加杏仁主之其證應內麻黃以其人逆痺故不內之若逆而內之必厥所以狀者以其人血虛麻黃發其陽故也 第五變若面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面加大黃以利之前四變隨證加減施治猶未離本來純黑至第五變其證頗似戴陽而能獨斷陽明胃熱乃加大黃以利之按陽明病面合赤色不可攻之爲其腎虛陽氣不藏故以攻爲戒而此平昔陰虧血虛反用大



黃利之者以其受暑見難有面熱如醉而脈見寸沉尺微者非表邪怱鬱而為胃中熱蘊無從竟行  
游散致熱不以陰虛為慮而氣抗脫也嗟夫仲景治咳全不從咳起見治其支飲下其逆氣衝氣法中  
之法逆刃有餘千金祖述其義以為支飲咳逆之成則

咳而上氣肺脹其脈浮心下有水氣膈下痛引缺盆設若有熱者必躡其人常倚伏小青龍如石膏湯至  
之方 石膏 乾薑 桂心 細辛 芍藥 麻黃 四兩芍藥 甘草 三兩夏 半升五味子 一升 右九

味咳咀以水一斗先煮麻黃減二升去沫下藥煮取二升半強者服一升弱者減之小兒服四合仲景

**衍義** 小青龍湯原為咳逆倚息不得卧之首推今因心下有水氣而脈浮頗有似乎風水之候但彼

因身腫自汗不渴知病在表故用越婢此因肺脹喘滿痛引缺盆知病在裏故用小青龍加石膏仍不

出越婢法  
射干麻黃湯 治咳而上氣喉中如水雞聲者方 射干 細辛 款冬花 紫苑 三兩麻黃 生薑 四

兩半夏 五味子 各一太棗 七枚 右九味咳咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫內藥煮取三

升去滓分三服日三  
**衍義** 上氣而作水雞聲乃是痰厥其氣氣觸其痰風寒入肺之一驗故於小青龍方中除桂心之熱

芍藥之收甘草之緩而加射干紫苑款冬太棗專以麻黃細辛發表射干五味下氣款冬紫苑潤燥半

夏生薑開痰四法萃於一方分解其邪太棗運行脾津以和藥性也  
厚朴麻黃湯 治咳逆上氣胸滿喉中不利如水雞聲其脈浮者方 厚朴 五兩麻黃 四兩石膏 細辛

乾薑 各二兩小麥 一升杏仁 半夏 五味子 各半 右九味咳咀以水一斗二升先煮麥熟去麥內藥

煮三升去滓分三服日三  
**衍義** 咳而脈浮者外邪居多法當發散為主故於小青龍湯中除去桂枝湯三味加入厚朴以下氣



石膏以清熱小麥引入胃中助其升發之氣也

澤漆湯 治上氣而脈沉者方 澤漆三斤細切以東流水 甘草五升 桂心半斤 人參五升 半夏五升 生薑五升 紫莞一作紫參 白前各五

黃芩 甘草 桂心 人參 右九味內澤漆汁中煮取五升每服五合日三夜一

行義 咳而脈沉邪在營分熱過於營反而不出其血必結邪氣外襲故用澤漆破血為君加以生薑

半夏之開痰紫莞白前之下氣黃芩之清熱桂心之和營人參甘草匡助胃氣以行藥力俾壘一空元

氣不獨製方之妙若此得不以之為法耶

麥門冬湯 下氣止逆治火逆上氣咽喉不利方 麥門冬汁三升半夏一升粳米三合人參 甘草各

兩大棗二十枚 右六味以水一斗二升煮取六升去滓分四服日三夜一

行義 此胃中津液乾枯虛火上炎之候凡肺氣有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也故於

竹葉石膏湯中偏除方名二味而加麥門冬數倍為君人參甘草粳米以滋肺母使水穀之精微皆得

上注於肺自然沃澤無虞當知火逆上氣皆是胃中痰氣不清上溢肺隨占據津液流行之道而然

以倍用半夏更加大棗通津除飲為先與義全在乎此若渴飲不除津液不致雖日用潤肺生津之劑

烏能建止逆下氣之勳哉俗以半夏性燥不用殊失立方之旨

麻黃石膏湯 治上氣胸滿方 麻黃四兩石膏如雞子大 杏仁半升 右五味以水一

斗先煮小麥熟去麥下藥煮取三升去滓分三服咳逆用此治久逆上氣喉中如水雞鳴 右五味以水一

行義 此於麻杏甘石湯中除去甘草之緩中易入厚朴以泄滿小麥以助肺胃而資少陽生發之氣

以其得春升之氣最先也

十棗湯 夫有支飲家咳煩胸中痛者不卒死至一百日一歲可與此方 大棗十枚 大戟 甘逆 芫

花等分 右大戟甘逆芫花搗為末以水一升五合煮棗取八合去滓內藥末強者一錢七贏者半七

頓服平旦服而不下者平旦更加半七下後自然補養

頓服平旦服而不下者平旦更加半七下後自然補養



**衍義** 十棗湯方在傷寒門中治表已解裏未和痞滿脇痛在全體中治懸飲內痛千金取治支飲咳煩胸中久痛總取峻攻痰積以破宿積

欬而引脇下痛亦十棗湯主之

**溫脾湯** 治食飢而咳者方 甘草四兩大棗十枚 右二味呖咀以水五升煮取二升分三服若咽中

痛而聲鳴者加乾薑一兩

**衍義** 肺胃虛寒則咳故用甘草溫散臟腑寒熱邪氣大棗安中養脾其建溫脾之功世本方下註治食飽而咳宜有食飽胃實而咳反用甘草大棗二味實之之理故力正之

**百部根湯** 治嗽不得卧兩眼突出方 百部根 生薑各一細辛 甘草略三貝母 白木 五味子

各三挂心四兩麻黃六兩 右九味呖咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服古今錄驗有杏仁

**衍義** 嗽不得卧兩眼突出明是寒鬱熱邪為患故首取百部之溫散肺氣麻桂薑辛之開發肺邪貝母助百部消寒木甘助麻桂透表五味收麻辛之散也

**海藻湯** 治咳而下利胸中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒方 海藻

四兩半夏 五味子各半升生薑一兩 細辛三兩 茯苓六兩 杏仁五十枚

升去滓分三服日三 一方無五味子生薑 右七味呖咀以水一斗煮取三

**衍義** 咳而下利水飲溫於肺胃滲於大腸而見痞逆短氣心中時悸者心火惡水之象也四肢不欲

動不欲食者脾氣傷也背痛是寒者陽氣失職不能榮於陽位也故用海藻之鹹順而泄留飲水氣杏

仁下氣泄滯茯苓辛薑除痰垢五味收飲肺氣也

**白前湯** 治水咳逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧咽中作水雞鳴方 白前 紫菀 半

夏 大戟各二 右四味呖咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分為三服

**衍義** 咳逆上氣而見肢體浮腫作水雞聲乃水飲溢於肺胃流入百骸故用白前以疏肺氣紫菀以



散魚氣半夏以滌痰氣大戟以利水氣皆從金匱澤漆湯中採出大戟之利水與澤漆不殊

治九種氣嗽欲免百病方 乾薑 半夏 細辛 紫苑 芫花花一作吳茱萸 茯苓 甘草 甘遂

防葵 人參 烏頭 大黃 杏仁各五 葶藶二分 巴豆 厚朴 白薇各一 遠志 菖蒲 五味子

前胡 枳實 蜀椒 皂莢 當歸 大戟 桂心各半 右二十八味為末蜜丸如梧子大先食

服二九日二服以知為度不知增之

衍義 氣嗽而兼九種百病之治故當採寒熱補瀉氣血痰水及乎峻攻之味無一不具苟非龐雜之

方亦無以療龐雜之病

麻黃散 治上氣嗽方 麻黃半斤 杏仁百枚 甘草三兩 桂心一兩 右四味治下篩別研杏仁如脂內

藥末和合氣上時服一方寸七食久氣未下重服一方寸七可至三七氣發便服即止 一方去桂心

甘草

衍義 上氣而嗽非開泄肺氣無以逞止逆之功故取傷寒麻黃湯溫散胸中之邪不必更加一味素

亂先聖成則

蜀椒丸 治上氣咳嗽太醫令王叔和所撰御服甚良方 蜀椒五分 烏頭 杏仁 石菖蒲 礬石云一

石皂莢各一 款冬花 細辛 紫苑 乾薑各三 麻黃 吳茱萸各四 右十二味為末蜜丸如梧子

大者時吞二九治二十年久嗽不過二十九

衍義 辛溫破結之劑彙集一方以治積年冷氣頑痰可謂峻矣更須礬石之專攻腹中堅癖皂莢之

去風拔毒通關利竅何憚二十年久嗽不能克應乎

通氣丸 治久上氣咳嗽咽中腥臭塵氣覺心痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒瘕時氣食不生肌肉胸中膈塞

嘔逆多唾惡心心中堅滿飲多食少惡症淋痛病方 蜀椒二升 飴糖三升 杏仁 天門冬 乾薑

人參各四 烏頭七分 桂心六分 大附子五枚 蜈蚣五節 石十味為末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗

人參各四 烏頭七分 桂心六分 大附子五枚 蜈蚣五節 石十味為末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗



十料詳飴乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三四服以胸中溫為度若夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿加也有停飲加葶藶三兩

**衍義** 金匱大建中湯專取蜀椒下氣止逆乾薑溫中破積人參補正除邪膠飴潤肺止嗽以治胸膈寒積出見有頭足上下痛不可觸千金加烏附桂心以攻毒破結杏仁泄肺散滿蜈蚣截風解毒天門冬除咳逆寒熱并化烏附椒薑之燥烈也

治咳逆上氣方 蜀椒 桂心 海蛤各四昆布 海藻 乾薑 細辛各六 麥門冬十分 右八味為

末蜜丸如梧子大飲服十丸加至二十九日三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲咳服此方得瘥

**衍義** 咳逆日久不除必是寒痰膠積之故故用椒桂薑辛以蒐肺絡之寒邪海蛤昆藻以破肺竅之痰氣用麥門冬者不特治咳并滋方中辛燥諸味詳喉中如吹管聲宜非病在肺竅之明驗乎

治咳嗽胸脅支滿多唾上氣方 礬石煅碎 烏頭不用 菖蒲各一細辛 黃環各二 杏仁 款冬花 紫苑各三 吳茱萸四分 乾薑五分 蜀椒五合 右十二味為末蜜丸如梧子大每服一九著牙上嚥汁日

五六服劇者常含不止○又方 薑汁半升 砂糖五合 右二味煎薑汁減半內糖更煎服之○又方白糖五分 皂莢末十枚 右二味先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如小豆先食服三九○又

方 酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之○又方 巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三枚○又方 服芥子七丸以油酒下之

**衍義** 咳逆胸脇支滿濁痰委積清道也上氣多唾寒飲溢於膈上也方中礬石治敗毒癰邪氣烏頭散風寒濕痺心腹冷痛菖蒲細辛溫利九竅黃環治咳逆寒熱杏仁款冬紫苑並主咳逆上氣乾薑蜀椒茱萸並泄胸中逆滿以溫咳逆多唾也○又方 薑汁半升 散溫肺砂糖甘緩 和脾火衰痰清者為宜



又方 皂莢滌除痰垢飴糖緩其暴烈 又方 酒浸肥皂莢取吐較飴丸者尤甚 又方 以巴豆炮黑勿破碎服者取其毒烈傷犯喉吻也此惟冷積年久嗽不止者宜之 又方 服芥子入肺搜痰即控涎丹之意

射干煎 治咳嗽上氣方

生射干

款冬花略二

紫苑

細辛

桑白皮

附子

甘草

白蜜

竹瀝

生薑汁各一升一云

飴糖三兩

右十一味先以射干內白蜜竹瀝中煮五六沸去之

咀六

物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴糖薑汁煎如餠服如酸棗一九日三劑者夜二不止

加之以止為度

又方 咳嗽上氣有腎寒肺熱之分此治腎虛火乘於肺故用附子攝腎歸源細辛下通腎氣射干上散肺結款冬花紫苑滋燥潤肺薑汁開發桑皮竹瀝之性流動脾飴白蜜之滯也

杏仁煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

射干煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

又方 治急暴嗽失聲語不出方 杏仁 薑汁 砂糖 蜜糖 一紫苑 五味子略三 通草 貝母 桑皮五兩 右九味以水九升煮取三升去滓內杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再後稍加之

射干煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

射干煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

射干煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

射干煎

治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合

五味子

款冬花略三

紫苑

乾薑略二

桂心三兩

甘草

白蜜

右八味以水一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁

中搜令相得煎如飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為度

通經絡桑皮瀉肺之熱五味收肺之津得薑汁之辛散杏仁之開泄可無飲閉邪風之患紫苑通肺經之血貝母消肺鬱之痰沙糖理胃中之滯蜂蜜滋膈上之燥也



通聲膏方 五味子 欬冬花 通草 參 青竹皮 細辛 桂心 芎藭 杏仁 薑汁

煎令調和酒服棗大二枚  
白蜜二升 棗膏三升 酥五升 右十三味咬咀以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏酥蜜

肺之氣欬冬竹茹清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通草芎藭利肺之竅杏仁酥蜜薑汁棗膏滋培津氣而通其聲大腸主津故以此方隸之此門

杏仁飲子 治暴熱嗽方 杏仁 橘皮 一兩 柴胡 四兩 右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

嗽起於暴是實非虛杏仁蘇子橘皮皆泄肺之品柴胡散寒熱之邪

蘇子煎 治上氣咳嗽方 蘇子 杏仁 生薑汁 地黃汁 白蜜 右五味搗蘇子以薑汁地

黃汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆又絞令味盡去滓熬杏仁令黃黑治如脂又以向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一

乾薑末五兩 膠飴一斤 右二味和令調蒸五升米下冷以棗大含化稍稍咽之日五夜二

咳嗽日久而客邪未除鹽化為熱故用薑汁散邪地黃滋熱且製入蘇子順氣味中更以杏仁款黑如大陷胸丸中法專滌胸中宿垢內蜜熬煎如飴緩行搜逐而無驟傷中氣之患如或病人肥盛素多痰濕者宜從崔氏去地黃例 又方單用乾薑之辛散肺胃之寒膠飴緩其辛燥頻令嚙化與上

方藥品雖變而功則一揆

芫花煎 治新久嗽方 芫花 乾薑 白蜜 二升 右二味為末內蜜中令相和微火煎令如糜每

服如棗核大一枚日三夜一以知為度欲利者多服 深以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升

衍義 以芫花走而不守之味製入乾薑守而不走味中使邪氣去而正氣守內入蜜中以和走守性



款冬煎 治同前 款冬花 乾薑 紫苑各三五味二兩 款冬花一兩 款冬花今赤 右五味咬咀以水一斗煮

三味取三升半去滓內芫花乾薑末如蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如飴每服半棗許日三

衍義 於芫花煎中加款冬紫苑以緩芫花乾薑之烈五味以收耗散之津藥品雖倍而功反稍遜於前

治三十年咳嗽或喘或咳咳雖不同悉主之方 細辛 款冬花 防風 紫苑各三 藜蘆二兩 蜀椒合

右六味咬咀取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛次款冬次椒以太棗百枚間著諸藥以水一斗二升微水煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽吐者可小增服之便吐膿囊裏結吐後勿令飲食咳愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

衍義 方中細辛款冬防風紫苑蜀椒等味助藜蘆湧吐之性製入大棗之中免逆腸胃積垢峻藥緩攻之妙無以逾之

治三十年久嗽方 百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸七日三服外臺和錫一斤熬成煎以溫湯服二合

衍義 久嗽諸藥不應寸白蟲生肺中故用百部專力殺蟲匹馬單刀不假他味佐使外臺之飴深師之蜜不過借甘溫之味引入蟲口近世師家治久嗽方不問有蟲無蟲舉用此味每致苦寒傷伐胃氣而致天札者不少是宜先哲立方之過歟

又方 紫苑二兩 款冬花 三兩 右二味治下節先食飲服方寸七日三服七日瘥

衍義 此方無問暴嗽久嗽虛嗽實嗽有痰無痰有血無血俱無妨礙但客邪勢甚者無益於治也

又方 白蜜一斤 生薑取汁 右二味先秤銅銚助兩訖內蜜復秤和數次內薑汁以微火煎令薑汁盡

惟有蜜斤兩乃止旦服如棗大含一九日三服禁一切雜食



衍義

蜜取甘潤薑取辛散辛甘合劑專破癥結但火逆咽痛非其所宜

治久嗽不瘥方

兔屎如好

硃砂二分

胡桐津一分

右三味為末

蜜丸如梧子大

每服三九

以粥飲下

日三服

吐令物盡即瘥

衍義

免屎為目科消翳要藥故千金取治肺中宿滯得硃砂之攻堅破積梧桐津之搜滌癥垢為形

濁氣藏久嗽之峻藥但梧桐津世鮮收取乃桐花開時飄忽沾衣污不可滌者是專取濁惡之物以攻

濁惡之垢也吾觀閩人用桐皮漬水沐髮則不染塵垢用皮代津未為不可硃砂善爛金銀硃砂能未

五金無硃砂之毒劣以之代用亦無不可

紫苑丸

治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧方

紫苑

貝母

半夏

桑白皮

百部

射干

五味子

治五

皂莢

乾薑

款冬花

細辛

橘皮

鬼督郵

硃砂

白石英

杏仁

蜈蚣

二枚

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再服稍加至二十九日惟取無半更射干乾薑橘皮鬼督

柏皮一兩送下

衍義

久嗽積年不愈必有宿垢留伏於中呀聲一發則伏火內動所以坐卧不安故用皂莢射干督

郵之屬辟除惡毒兼石英薑草助力祛邪紫苑款冬等味助供佐使之用耳

款冬丸

治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不得卧方

款冬花

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

菖

蒲人參

細辛

芫花

紫苑

甘草

桔梗

防風

芫花

茯苓

皂莢

三

右十六味

為末蜜丸如梧子大酒服三九日三

衍義

前方專辟癥垢此方兼散滯血滯血未有不兼癥垢者所以仍用皂莢滌垢薑草破結更須芫

花利水桂心散滯人參茯苓甘草扶助胃氣以振祛邪之力餘皆疎風治嗽之常味也

又方

款冬花

紫苑

細辛

蜀椒

桂心

菖蒲

人參

甘草

防風

石解

芫花

當歸

藥本

白木

半夏

天雄

鍾乳

麻黃

獨活

二兩

烏頭

附子

芫花

桃仁

五枚

衍義

此方專治肺中宿滯得硃砂之攻堅破積梧桐津之搜滌癥垢為形

濁氣藏久嗽之峻藥但梧桐津世鮮收取乃桐花開時飄忽沾衣污不可滌者是專取濁惡之物以攻

濁惡之垢也吾觀閩人用桐皮漬水沐髮則不染塵垢用皮代津未為不可硃砂善爛金銀硃砂能未

五金無硃砂之毒劣以之代用亦無不可

紫苑丸

治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧方

紫苑

貝母

半夏

桑白皮



二十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日二服不知加之酒清服亦得

**衍義** 此以麻黃附子細辛湯破除陰邪為主而兼白朮鍾乳雄烏半夏羌花甘草激諸味振發辛烈之性加以散血祛風破結利氣更濟以人參大力無堅不克但當諒其人之元氣能任與否庶幾無誤治之失

又方 款冬花 紫苑 乾薑 桂心 各三分 杏仁 皂莢 礬石 菖蒲 烏頭 各一分 川椒 各五分 吳茱萸 六合 右十二味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三夜一二十年嗽不過五十日愈患咳嗽喉鳴上氣服一劑永瘥

**衍義** 礬石治腹中堅癖之峻藥兼用皂莢滌除痰垢濟以烏椒薑辛桂枝芫荽辛烈利氣等味得款冬紫苑引入肺經其義迅掃之功自紫苑丸至此四方首主宿垢次兼滯血三破陰邪此攻堅主癖皆湯練臟腑之劑不可與尋常治嗽等論也

治肺傷咳嗽膿血腸澀背痛不能食惡風目暗眊眊足脰寒冷方 白膠 生薑 各五兩 桂心 人參 紫苑 各二兩 地黃 切半 桑白皮 切一川 芍 大麻仁 飴糖 各一大麥 三升 大棗 仁十枚 右十二味以水一斗五升煮麥取一斗去麥內藥煮取三升分五服

**衍義** 白膠乃楓香脂其性疎通善於開發肺氣故取以治咳嗽膿血川芍地黃得桂心和榮之力紫苑散結之功可無委積頓湧之虞且人參助氣於上麻仁滋化於下桑皮瀉肺氣之滿大麥降肝氣之逆大棗飴糖滋腸胃之津氣也

五味子湯 治唾中有膿血牽胸脇痛方 五味子 桔梗 紫苑 甘草 川斷 各二兩 桑皮 地黃 各五兩 右竹茹 三兩 赤小豆 一升 右九味以水九升煮取一升七合分三服

**衍義** 此火乘於肺所以唾中有膿血而胸脇牽痛乃血不榮筋之故用五味紫苑滋培津血桔梗桑皮疎泄肺氣竹茹小豆清膈上火生地逐傷中血川斷通行經絡甘草平調中氣不獨為火乘肺氣之



專藥并可為熱傷肺痿之神丹

竹皮湯

治咳逆下血不息方

生竹皮二兩 紫苑二兩 飴糖一斤 生地切一

右四味咀咀以水六升

煮取三升去滓分三服

衍義

咳逆下血而用竹茹清胃紫苑和血飴糖滋津地黃逐血然必不經火焙之鮮者方有散血之

功若止血之用必明標乾地黃矣設無鮮者不妨以乾者酒浸或稍加桂心熱因熱用要在臨時權變

可也

百部丸

治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根二兩 升麻半兩 桂心

五味子

甘草 乾薑 紫苑

衍義

嗽不得息明明是火逆為患故用百部導之於下升麻散之於上薑桂之辛以散火五味之酸

以飲津紫苑甘草既能治嗽并可和血

治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁

杏仁

猪膏二合 蜜

飴糖

右五味先以猪

膏煎杏仁色黃出之以紙拭令盡搗如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核大一枚日夜六七

服漸漸增加之

衍義 喉中氣結似乎有物故薑汁杏仁開發肺氣飴糖蜂蜜猪脂并滋津血然惟大便實者為宜

治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止方

好酥三十斤 三遍煉停取凝當出醍醐一合日三服瘥止一切

藥皆不出此神方○又方

三煉酥如雞子黃適寒溫澀鼻中日二夜一

衍義

肺咳而用醍醐以滋津血之燥乃治無痰乾咳之的方

一法用乳酥煑化灌鼻孔以鼻為肺

數也

鍾乳七星散

治寒冷咳嗽上氣胸滿唾膿血方

鍾乳

礬石

欬冬花

桂心等分

右四味

治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日三不止加之數試大驗又云臨卧吸服



之○又方 鍾乳 細辛 欬冬花 天雄 紫莖 石膏等分 右六味治下節取如大豆七聚如

前法吸之日二只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知少益之勿太多

七星散 治三十年咳嗽方 欬冬花 紫莖 桑白皮 代赭 細辛 伏龍肝略一 右六味治下

節作七星聚如篇豆者以竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三九凡服四日日後作七

星聚以一轆肉炙令熟以輟轉藥聚上令藥悉徧肉上仰卧咀嚼細細咽汁令藥力散散割割無毒氣

入咽中藥力盡總咽却取瘥止

**衍義** 七星之名聚其聚形以示靈驗之意方用鍾乳溫肺為主礬石滌痰欬冬下氣桂心散結利關

節也○又方除去礬石桂心易入石膏佐鍾乳為去熱之嚮導天雄烈勝桂心佐鍾乳以破結積之氣

紫莖佐欬冬以通肺氣細辛專利關竅也又以代赭之重以鎮逆氣佐伏龍肝之暖以散滯血其餘欬

冬紫莖桑皮細辛雖治嗽常品專藉血肉同氣之物以為內應獨不用參肉者以其能助痰肉動風氣

且又七星所禁也

治嗽重法 以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以重黃末薄布艾上務令調勻以艾一枚如紙長捲之作

十枚先以火燒纏下去救烟從孔出口吸烟咽之取吐止明旦復重之如前日一二止自然可瘥得食

白粥餘皆忌○又方 重黃一兩研令細以蠟紙并上重黃相入調勻捲之如前法重之亦如上法日

一二止以吐為度七日將息後以羊肉羹補之○又方 藍青布廣四寸上布艾艾上布青礬末礬上

布少熏黃末又布少鹽又布少鼓末急捲之燒令著內燥罐中以紙蒙頭便作一小孔取吸烟細細咽

之以吐為度若心胸悶時畧歇烟盡止日一二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

**衍義** 三法總為頑痰固結藥所不應者設若有沉寒則兼熟艾有毒熱則兼蜂窠有積垢則兼青礬

及鹽鼓等味咸取重黃取吐以辟毒惡氣也  
論曰凡上氣多有脫吐藥得瘥者亦有鍼灸得除者宜深體悟之



灸法

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥 又以蒲當乳頭周圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯 又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度 灸從大椎數下行第五節下六節上穴在中間即神隨年壯并主上氣灸手屈臂中橫文外骨撻頭得痛處十四壯 上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣咳逆短氣風勞百病灸肩井二百壯 上氣短氣咳逆胸背痛灸風門熱府百壯 上氣咳逆胸滿短氣牽背痛灸巨闕期門各五十壯 上氣胸滿咳逆短氣灸雲門五十壯 上氣咳逆胸痺背痛灸胸膺百壯不鍼 上氣咳逆短氣灸臍中五十壯 上氣氣閉咳逆冷聲破喉猜灸天瞿五十壯一名天窓逆氣虛勞寒損憂患筋骨痠痛心中咳逆泄注腹滿喉痺頸項強腸痔痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻中乾煩滿往走易氣凡二十病皆灸絕骨五十壯穴在內踝二三寸宛宛中

痰飲第六

論一首 方四十首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼重謂之溢飲其人咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲 凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而顛先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿嘔而痛水在於腎心下悸 夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脈平也留飲形不發作無熱脈微煩滿不能食脈沉滑者留飲病有留飲者脇下痛引缺盆噉轉甚其人咳而不得卧引項上痛咳者如小兒掣飛狀夫胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沉者有留飲也心下有留飲



其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胸中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也  
膈上之病滿喘咳吐發則寒熱背痛惡寒自汗自出其人振振身悶劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉  
移在一臂其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自瘥人自瘥人病  
瘥飲者當用溫藥和之

小半夏湯 病心腹虛冷逆痰氣上胸膈滿不下食嘔逆者方 半夏一升 生薑一斤 橘皮四兩 右三

味以咀以水一斗煮取三兩分三服 若心中急及心痛內桂心四兩 若腹滿痛內當歸三兩羸弱

及老人尤宜服之 一方用人參二兩此參無橘

**衍義**

金匱小半夏湯治支飲不渴更合嘔吐噦中橘皮湯專取辛溫散結之味以治心腹虛冷等證  
總以溫理中氣為主若心中急痛寒熱糾結加桂心以散之血虛不能以統血脹滿腹痛加當歸以和  
之羸弱不能自主則加人參以補之此金匱法外法也

又方 半夏一升 生薑一斤 桂心三兩 甘草二兩 右四味以咀以水七升煮取二升半分三服

**衍義**

小半夏湯金匱本方只薑半二味今加桂心之散兼甘草之緩即苓桂木甘湯之變法

甘草湯 治心下痰飲胸脇支滿目眩方 甘草二兩 桂心 白朮各二兩 茯苓四兩 右四味以咀以水

六升宿漬煮取三升去滓服一升日三小使當利

**衍義**

金匱本名苓桂木甘湯此名甘草湯傷寒明中又名茯苓湯衍義見前十一卷中茯苓湯下

十棗湯

治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而咳者此懸飲也方見本卷

小青龍湯

病溢飲者當發其汗范汪用大青龍湯方見本卷

本防已湯

治胸間有支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈者用

此方 本防已三兩 桂心二兩 人參四兩 石膏十二兩 右四味以咀以水六升煮取二升分二服虛

者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒硝三合微下利即愈 一云不加芒



**衍義** 趙以德註金匱方曰支飲在膈間氣血皆不通利氣不利則與水同逆於肺而發喘滿血不利則與水雜搏結於心下而為痞堅腎氣上應水飲腎水之色黑血凝之色亦黑故驚之色見於面也脈沉為水緊為寒非別有寒邪即水氣之寒也醫難以吐下之法治然藥不切於病故不愈用木防己以散留飲結氣石膏主心肺逆氣人參助胃祛水桂心和榮開結且支飲得溫則行若邪客之淺在氣分多而虛者服之即愈若邪客之深在血分多而實者則愈後必再發以石膏為氣分之藥故去之芒硝為血分藥能治痰壅堅痰伐腎利水而為芒硝之佐故加之

**厚朴大黃湯** 夫酒客咳者必飲吐血此坐久飲過度所致其脈虛者必胸滿胸中有支飲此方主之

厚朴一尺大黃六兩枳實四兩右三味咬咀以水五升煮取二升溫服分二服

**衍義** 此即小承氣湯以大黃多逆名厚朴大黃湯若厚朴多即名厚朴三物湯此支飲胸滿必緣其人素多濕熱濁飲上逆所致故用瀉滌中焦藥治之支飲不得息葶藶太棗瀉肺湯治之方見十七卷肺癰中

嘔家不渴渴為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴即嘔者此為水停心下小半夏加茯苓湯主之

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸方 半夏一升生薑半斤茯苓三兩右三味

咬咀以水七升煮取一升五合去滓溫分再服胡治不用茯苓用桂心四兩

**衍義** 嘔家有痰嘔者痰去而渴者為欲解與傷寒之服小青龍湯已渴者寒去欲解同義今反不渴是積飲尚留去之未盡故用半夏散結勝濕生薑散氣止嘔千金更加茯苓佐之與治卒嘔吐心下痞

膈間有水眩悸同法

**五苓散** 假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也此方主之方見前九卷傷寒上

**椒目丸** 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之 椒目 木防己 大黃各一兩 右四味

為末蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三夜稍增口中津液止渴者加芒硝半兩



**衍義**

金匱名已椒黃薤黃丸水積腸間則肺氣不宣膈鬱成熱而腹滿津液不主行而口舌乾燥用木防已椒目亭瀝利水散結而亭瀝無能利腸然腸胃所受水穀之氣和實腹滿非輕劑所能治必加大黃以瀉之若口中有津液則水去津回可勿藥矣若仍作渴者此痰飲聚於血分必加芒硝以祛之甘遂半夏湯 病者脈伏其人欲自利者反快雖心下結堅滿此為留飲欲去故也此方主之 甘遂大者半夏十二枚以水三枚升半升者取半升甘草一升如指大以水三枚右四味以蜜半升內二藥汁合一升半煎取八合頓服之

**衍義**

留飲堵塞氣滯胃氣不得轉輸故脈伏不顯若留飲既下胃氣受傷必欲自利而反快者中焦所塞暫通也通而復積故續堅滿必更用藥盡逐之然欲直達其積飲莫若甘遂快利用之為君欲和脾胃除心下堅又必以半夏佐之然甘遂藥停濕何留飲用之甘草與甘遂相反何一方並用蓋甘遂緩甘遂之性使不急速徘徊逐其所留甘遂藥木鬱土中成堅滿又佐半夏以和胃消堅也

**大扶苓湯**

主胸中結痰飲癖臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方 扶苓 白朮各三兩桂心細辛一兩生薑各四兩橘皮 附子 當歸各二兩右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服服三

**創良**

**衍義**

水飲結於臍下雖有桂苓不得生附不能破除陰分之水癖雖有半夏不得生木不能祛滌胸中之痰氣橘皮者扶苓之佐細辛者附子之佐當歸者桂心之佐也

**扶苓湯**

治胸膈痰滿方 扶苓四兩半夏一升生薑一斤桂心八兩右四味咬咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚

**衍義**

痰氣聚於胸中故用小半夏加扶苓湯不得桂心之辛散難以逞破的之功冷極加附子是皆真陽虛者而言氣滿加檳榔是指痰氣感者而言非謂二味可以並入一方也 胃脘嘔吐門中名半夏湯藥味雖同而分兩不賴故兩存之



大半夏湯 治冷痰飲癰胸膈中氣不運方 半夏一升 白朮三兩 茯苓 人參 甘草 桂心 附子  
各二生薑八兩 右八味咀咀以水八升煮取三升分三服

衍義 金匱大半夏湯但用半夏人參甘草三味水蜜和煎以治胃反嘔吐此用參附朮附桂附合苓  
桂朮甘湯仍用金匱三味以治冷痰飲癰故不用水蜜和煎而用生薑以滌痰氣也

半夏湯 治痰飲癰氣吞酸方 半夏 吳茱萸 各三 薑六兩 附子一枚 右四味以水五升煮取二  
升半分三服老少各半日三

衍義 前方以中氣不運冷痰留積故用參朮佐半夏附子此以曲直作酸故用吳茱萸通達肝氣以佐  
半夏附子仍用生薑開豁痰癰也

乾東湯 治腫及支滿餅飲方 大棗十枚 大戟 大黃 甘草 甘遂 各二 黃芩 二兩 芫花 芫花 各  
兩 右八味咀咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下為度

衍義 此即十棗湯加用甘草之相反激發大戟芫花逐飲之性更加芫花以佐芫花之破積大黃黃  
芩以佐大戟而攻懸飲堅僻也

當歸湯 治留飲宿食不消腹中積聚轉下方 當歸 人參 桂心 黃芩 芍藥 甘草 芒硝 各  
兩 大黃 四兩 澤瀉 生薑 各三 右十味咀咀以水一斗煮取三升分三服

衍義 中氣式微不能輸運而致癰積留著水道不利故用參甘歸芍平調血氣硝黃薑桂攻理痰積  
黃芩澤瀉分利支河水道而通滯阻之熱也

治痰飲飲食不消乾嘔方 人參 旋覆花 橘皮 細辛 各一 澤瀉 白朮 杏仁 枳實 各二 茯苓  
半夏 生薑 柴胡 芍藥 各三 右十三味咀咀以水九升煮取二升六合分三服日二

衍義 痰氣阻逆於中非開提於上不能開痰進食降濁升清故用旋覆花杏仁疎泄肺氣半夏枳實  
開豁痰氣人參白朮健運中氣柴胡芍藥調和肝氣細辛橘皮開發滯氣茯苓澤瀉通調水氣使肺氣



降而胃氣升肝氣平而穀氣運濁氣散而正氣安矣

治胸中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

皮三兩 右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服 杏仁 柑皮各四兩 半夏八兩 茯苓五兩 橘

**衍義** 杏仁開拓胸中之氣薑平消豁膈上之痰橘榔茯苓泄利腸中之水柑橘二皮一寒一溫升降

上下諸氣此惟病氣未固元氣未滿者宜之

吳茱萸湯 治胸中積冷心嘈煩滿注洋不下飲食心胸應背痛方

吳茱萸三兩 半夏四兩 人參 桂心 各二 甘草一兩 生薑五兩 大棗二十枚 右七味咬咀以水九升煮三升去滓分三服日三

**衍義** 本氣虛寒之人胸中寒熱飲滯積所以注洋飲食艱於消赴蘊積而從火化所以嘈煩榮氣不

能充於陽位所以背痛故用吳桂通陽薑平滌飲人參甘草扶胃進食大棗運行脾津乃大小半夏湯

之發源也

治胸膈心腹中痰水冷氣心下注洋嘈煩或水鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不能飲食此皆胃氣

弱受冷故也其脈來沉弦細遲惡主之方

橘皮 桂心 人參 甘草 桔梗各二兩 右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服病先有時水

下者用白朮三兩去旋覆若欲得利者加大黃二兩須微調者用乾地黃

**衍義** 此亦大小半夏之發源彼以胸痛引背故用吳茱此以脇急脹痛故用桂心又以口出清水故

用旋覆細辛橘皮桔梗治冷涎泛芍藥佐桂心以治脇急茯苓佐人參以扶胃弱

治冷熱久癖實不能飲食

下虛滿如水狀方 前胡 半夏 茯苓 生薑各四兩 枳實 白朮 甘草

各三 桂心二兩 右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

**衍義**

前胡湯 治胸中久寒癖實膈塞胸膈氣不通利三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重卧不欲起方

前胡 枳實 桂心 甘草 枳實 白朮 甘草 各三 桂心二兩 右八味咬咀以水八升煮取三升分三服



前胡 人參 當歸 半夏 甘草 枳實 防風 麥冬 吳茱萸 黃芩 各一  
生薑 四兩 杏仁 十枚

**衍義** 右十二味以水一斗煮取三升去滓分三服深師方云若胸下滿加大  
**胸膈塞痛良由冷熱不調故方中寒熱兼濟補瀉互投而加下氣滌痰之味**

**旋覆花湯** 治胸膈痰結唾如膠不下食者方 旋覆花 細辛 前胡 茯苓 甘草 各一  
生薑 八兩

**桂心四兩 半夏一升 烏頭五枚** 右九味以水九升煮取三升去滓分三服

**衍義** 此以小半夏加茯苓湯滌痰劑中加旋覆花前胡烏頭桂心細辛甘草以祛風毒然惟上熱咽乾

下元虛冷者為之合劑若熱邪固結誤投禍不旋踵不可不慎

**薑椒湯** 治胸中積聚痰飲飲食減少胃氣不足咳逆嘔吐方 薑汁 七合 川椒 三合 桂心 附子 甘

草 各一 橘皮 桔梗 茯苓 各二 半夏 三兩 右九味以水九升煮取二升半去滓內薑汁煮取

二升分三服服三劑止若欲服大散諸五石丸必先服此湯及進黃芪丸佳 一方不用甘草

**衍義** 川椒桂附入於二陳湯中但加桔梗舟楫之劑載諸藥以破胸中冷積寒痰也

**薑附湯** 治痰冷癰氣嘔沫胸滿短氣頭痛飲食不消化方 生薑 八兩 附子 四兩 生

水 八升 煮取二升分四服亦主卒風 右二味以咀以

**衍義** 於前方中但取薑汁附子二味辟冷癰較之前方其力倍專乃乾薑附子湯之變法彼取溫中

故用乾薑此取滌痰故用薑汁兩不移易之定法

**擦膈散** 治心上結痰飲實寒冷心悶方 瓜蒂 二枚 赤小豆 二七 人參 甘草 各一

為末酒服方寸七日二亦治諸黃 右四味治下飾

**衍義** 擦膈者擦動膈上痰飲使之上涌也方用人參甘草入於瓜蒂散中使人參助其上涌之一

舉而傾囊盡出也

**斷膈湯** 治胸中痰癖方 恒山 甘草 松蘿 各一 瓜蒂 二枚 右四味以水酒各一斗半煮取

一斗半

一斗半

一斗半

一斗半



一升半分三服後漸減之得快吐後須服半夏方見本

**衍義** 斷膈者斷除膈上痰癖也瓜蒂吐膈中寒實加以恒山涌膈上稠痰松蘿乃松上女蘿氣清味

苦能吐肝膽風痰與赤小豆之涌吐心色熱痰同而異吐後服半夏湯以實中土緣恒山瓜蒂皆傷

伐胃氣也

**松蘿湯** 治胸中痰積熱皆除方 松蘿二兩 烏梅 梔子各十枚 恒山 甘草各三兩 右五味咀咀以酒

三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止

**衍義** 松蘿湯中不用瓜蒂而用梔子以吐肺胃熱痰即用烏梅以收飲津液與吐後用半夏湯一意

**杜衡湯** 治吐百病方 杜衡 松蘿各三兩 瓜蒂二升 右三味咀咀以水一升二合清二宿去滓分二

服若一服即吐者止未吐者重服相去如人行十里久令藥力盡服稀糜一升即定老小用之亦佳

**衍義** 杜衡下氣消痰以其氣濁故用以助瓜蒂松蘿之涌吐

**蜜煎** 治寒熱方 蜜五合 恒山 甘草各二兩 右三味取二味咀咀以水一斗煮取二升去滓內

蜜溫服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水○又方 蜜六合 醋八合 右二味調和平旦頓服道

史猥猥然欲吐摘之若意中不盡明且更服無不大嘔安穩

**衍義** 蜜煎恒山兼甘草之甘緩與蜜同為戀膈之品專取緩搜膈上之痰也○又方以蜜醋多服須

更元兀欲吐乘勢以指摘吐之以無瓜蒂恒山等傷胃之藥故云安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胸膈中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即瘥方 單者若

作飲二三升許適冷飲二升須臾摘令吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人而渴則

**行氣** 若或苦能通清消之肺氣數則則嘔膽汁亦不損人

**葱白湯** 治冷氣膈脹發時頭痛悶亂欲吐不得者方 葱白二升 桃葉一握一作 珍珠 恒山 烏頭

甘草各半 右六味咀咀以酒水各四升和煮取三升去滓內珠末每服一升吐即止

人安心而用也自餘諸藥此八才也



衍義

葱白烏頭能吐風痰然須恒山佐之甘草和之葱白桃葉引之珍珠取以安神解毒此為安常

人安心而用也

自療腸散至此八方總皆一系變法

大五飲元

主五種飲一日胃飲水停在下二曰脾飲水停在下三曰痰飲水在胃中四曰濕飲

水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方

從容

遠志 苦參 藜蘆 烏賊骨 白朮 甘遂 大黃 石膏 括蘂狼 桔梗 半夏 紫

苑

前胡 五味子 芒硝 桂心 芫花 大戟 葶藶 黃芩 貝母 人參 茯苓 當歸

芍藥

各三 甘草 恒山 山藥 厚朴 細辛 附子 各三 巴豆 各三十 石三十三味治下節寒和

九如梧子大飲服三九日三稍稍加之以知為度

衍義

金匱有四飲之名千金有五飲之治其法則一師曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之

痰飲飲後水流在膈下咳唾引痛謂之懸飲千金謂之餅飲三日飲水流行歸於四肢當汗出而不汗

出身體疼重謂之溢飲四曰咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲千金謂之流飲四飲之外又

有留飲留飲伏在皮下則背惡寒留於膈下則痛引缺盆平時則短氣而渴四肢歷節痛發則喘滿吐

逆寒熱背痛腰疼目泣自出劇則振振身瞤謂之伏飲伏飲即留飲之伏而不動者千金合而言之則

為五飲而四飲之中支飲為最劇其留伏之飲則心膈四肢中外皆病兼有四者之患所以千金首列

留飲夫病人飲水多必暴喘滿食少飲多水停心下微者短氣甚者則悸悸則水在腎也若心下堅築

短氣惡水不欲飲水在心也吐涎沫欲飲水在肺也少氣身重水在脾也膈下支滿嘔而痛水在肝

也此舉言五飲致病五臟見證之大端金匱分隸而治千金兼該而行大旨水飲為陰類緩其人內乏

真陽雖有濕熱但總為粘黏不能稠厚所以五飲丸中必需辛溫益氣以鼓諸藥之力如人參白朮附

子桂心助陽藥也藜蘆恒山涌吐藥也大戟芫花甘遂葶藶破水藥也大黃芒硝攻下藥也半夏巴豆

滌痰藥也巴豆不獨滌痰兼能涌吐所以白散用之吐中便具發散之義使驅散之水從皮腠而泄也



其用甘草人參芍藥專取相反之味以激大戟芫花甘遂熬蘆攻伐之力因方中攻伐之劑過多恐其津隨飲脫是以蒺藜蒼朮預五味茯苓之屬又為必需其餘諸藥或相扶正或佐去邪總不出五種諸法以為五飲通治也

旋覆花丸 治停痰癖飲結在兩脇腹脹滿瀉瘦不能食食不消化喜嘔乾嘔大小便或澇或利腹中搖動作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方 旋覆花 桂心 枳實 人參 各五分

遂三分 吳茱萸 細辛 大黃 黃芩 葶藶 厚朴 芫花 橘皮 各四分 乾薑 芍藥 白朮 各六分

茯苓 狼毒 烏頭 礬石 各八分 右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後加以知為度

方無白朮狼毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮並有皂莢附子各二分蜀椒杏仁防葵各三分地黃四分

衍義 痰癖結聚腹脇喜嘔乾嘔眩暈欲倒故用旋覆花開結下氣行水消痰開發肺與大腸水氣之

味為主其間參朮桂心芫花甘遂葶藶大黃等與五飲丸相同者十餘味更加烏頭乾薑狼毒礬石其破積散癖之力不減五飲丸中大戟巴豆之烈也

中軍候黑丸 治癖飲停結滿悶目暗方 芫花 三兩 巴豆 八分 杏仁 五分 桂心 桔梗 各四分 右五味

為末蜜丸如胡豆每服三丸稍增得快下止

衍義 黑丸之名專取杏仁熬黑以滌胸中宿垢與巴豆破積不殊并取芫花利水桂心散血桔梗上通肺氣下走大腸所以水腫先從頭面至足頭眩身熱亦取用之本經治腹滿腸鳴幽幽豈非下走大腸之一驗乎

順流紫丸 治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上塞方 石膏 五分 桂心 四分

巴豆 七枚 代赭 烏賊骨 半夏 各三分 右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一九加至二九

胡治有紫 歸各三分 芫花 方無石膏半夏有當歸 一分 遂三分 茯苓 各三分 蘆五五分

衍義 紫丸專取代赭煨赤以鎮心下痰癖配以石膏之寒而化心下結熱并取半夏滌除痰飲為賊



清理氣血桂心分附腹血已且上滿陰涎下飲實積服此則痰水順流而下故以名方  
治停痰癖飲結在兩脇腹滿癰瘦不能飲食不消吞唾乾嘔大小便或澀或利方 旋覆花 人黃

附子 茯苓 椒目 桂心 芫花 狼毒 乾薑 芍藥 枳實 細辛 路 右十二味為末蜜

丸如梧子大飲下三九日三服後漸增

**衍義** 金匱大黃附子湯治脇下偏痛發熱以虛寒從下而上故用大黃附子溫藥下之細辛治陰邪

上逆之發熱此治停痰癖飲故加狼毒芫花枳實以佐大黃之湯癖乾薑桂心茯苓以佐附子之破結  
旋覆椒目芍藥以佐細辛散熱也

治風氣膈上痰飲方 用不開口苦飢一枚湯煮三五沸以物裏熨心膈上

**衍義** 苦飢大苦大寒大傷胃氣用以湯煮熨膈者取其引領濁惡之氣從皮毛泄也

治結積留飲癖囊胸滿飲食不消方 灸通谷五十壯

九蟲第七 論三首 方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居有頭尾長  
三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰虵蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀  
如蠶六曰胃蟲狀如蠅七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟻蟲至細微形如茅蟲狀伏蟲  
則羣蟲之主也就蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大至長四五寸亦能殺人肉蟲令人煩滿  
肺蟲令人咳嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟻蟲居腸腸之間多  
則為痔劇則為癰因人瘡疾則生諸癰疽癰癰癰癰癰癰無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏  
有或偏無此類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白蘆草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是尸蟲  
所畏也 論曰凡欲服補藥及治諸病須去諸蟲并痰飲宿癖醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力  
治肝勞生長蟲在肝為病恐畏腹中不安方 蠟 吳茱萸東行根皮 各三 乾漆 四兩 雞子 五枚 粳米粉



半斤 右五味搗吳茱萸皮為末和藥銅器中煎可九如小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒服五十九蟲當爛出雖綴於無異

**衍義** 諸蟲皆從濕熱生化濕熱之治莫善於風藥然蟲之濕皆屬內因內因之濕仍須治內風之

藥方可直達病情如肝勞生長蟲用蜂蠟至淡之味以散濕熱之病吳茱萸根走肝取東南走巽位者以通風氣而治內風乾漆殺蟲然非殺肉之味投其所喜不能引入其口使之爛出也

治心勞熱傷心有長蟲名曰蟲長一尺貫心為病方 雷丸 橘皮 桃仁一作石蠶 狼牙六分 貫

眾二枚蠶三枚 蕪荑 青箱 乾漆各四分 亂髮如雞子 吳茱萸根皮七分 右十二味為末蜜丸如

梧子大空腹苦酒下七九加至二七九日二服 一方無石蠶

**衍義** 治蟲諸藥如狼牙貫眾蕪荑青箱乾漆吳茱萸根皆能殺蟲獨雷丸專治心勞生蟲者甚有道

士治楊勸應聲蟲得此而愈以心為虛靈之藏言者心之聲故其所生之蟲亦靈慧而能應聲也

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下蟲方 大麻子八升東引吳茱萸根大者 橘皮二兩 右三

味以水煎臨時量服凡合禁嚴勿語道作樂蟲當聞便不下切忌之

**衍義** 黃根橘皮殺蟲得大麻子引入脾經誘入其口而殺之

治肺勞熱生蟲在肺為病方 狼牙三兩 吳茱萸根白皮五合 東行桑根白皮切一 右三味以酒

七升煮取一升平旦頓服之

**衍義** 狼牙黃根得桑根白皮引入肺經以殺其蟲為寸白專藥

治腎勞熱四肢腫急蛇蟲狀如茱萸在腎中為病方 蕪荑 胡粉 槐皮各一 乾漆二兩 貫眾三枚 杏

仁四十枚 吳茱萸五十枚 右七味治下篩平旦以井花水服方寸七加至一七半瘥止

**衍義** 蕪荑乾漆貫眾吳茱萸雖皆殺蟲之品胡粉引入於腎始能中的從甘草粉蜜湯中探出

治蛇蟲方 以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿不食空心頓服之 又方 珍珠二兩亂髮



大蛇科

右二味治下節以苦酒調旦起頓服之附後方用

**衍義** 鹽醋皆日用之品惟是專用二物之鹹酸便有化蟲之功效 蟲乃血之所化故用髮灰以散

潮血珍珠以散濕熱貴賤所票不同主治不能無異

**薤蕪丸** 治少小有蛇蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝

舉方 薤蕪 貫眾 雷丸 山茱萸 天冬 狼牙治八 薤蕪 甘菊治四 右八味為末蜜丸如

大豆三歲飲服五九五歲已上以意加之漸至十九加薤蕪六分名薤蕪丸治老小及婦人等萬病腹

內冷熱不通急滿痛胸膈堅滿手足煩熱上氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹內狀如水雞鳴女

月經不調無所不治

**衍義** 本經言薤蕪辟邪除毒取其辛散也貫眾雷丸狼牙薤蕪皆殺蟲之味山茱萸既能治心

下邪氣亦能斂肝腎精血天冬能殺三蟲去伏尸又能強骨髓甘菊能治惡風濕痺蟲乃風濕所化雖

無殺蟲之功能散濕熱即蟲失所養必隨諸殺蟲藥而下出矣

**治蛇蟲方** 薤蕪末以飲膳和服方寸匕不覺加之治蛇蟲

**治熱患有蛇蟲懷懷方** 薤蕪十分 乾漆十分 篇竹治二 右三味治下節米飲和一合服之日三

**治蛇蟲在胃中漸漸羸人方** 乾漆治 鹽醪酒 白蜜治一 右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核

一枚溫酒中宿勿食旦服之蟲必下未下更服治 又方 取棟實內酢苦酒中浸再宿用綿裹

內穀道中入三寸一日易之治長蟲

**治蛇蟲攻心腹痛方** 劉蒼沒根二斤以水七升煮取三升先食服之蟲即免出○又方 鶴雞為末苦

酒空腹服方寸匕佳○又方 七月七日採葵藜子陰乾燒灰先食服方寸匕七日三即瘥

**衍義** 薤蕪殺蟲借膽引入蟲口 薤蕪走氣分更益以乾漆破血篇竹殺蟲化濕熱 乾漆殺蟲酒

蜜浸蟲所好 苦棟殺蟲浸酒入綿以內穀道專主肛門之蟲 蒼沒根逐濕下行能治濕熱生蟲之

本草卷之六



善藥 鵝黃散 苦寒殺蟲得苦酒之酸收使不逆上然須用天名精子為真否則易偽 刺瘡瘰癧治瘰癧

破癰疽積聚專祛風木之邪能治內濕生蟲之專味  
治寸白蟲方 吳茱萸細根熟地大麻子三升款 右二味以水三升和粥取汁平旦頓服至巳時與好

食令飽須臾蟲出不瘥明旦更合服之不瘥三日服肝后治三蟲以 又方 麝香六分 狼牙四分 白

飲二分 右三味治下節以苦酒二合和一宿次早空腹服之○又方 胡麻一升 胡粉一兩 右二

味為末平旦空腹以猪肉臚汁嗽盡即瘥○又方 以椎子四十九枚去皮月土旬平旦空腹服七枚

七日服盡蟲消成水永瘥○又方 以吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿平旦分二服

凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不住用○又方 用石榴根如茱萸法亦可水煮服

○又方 麻仁五升搗取汁分五服亦治小兒蛇蟲○又方 以好麻油二升煎令熟內葱白三寸令

黑便熱冷頓服之○又方 熬餵令十分燥作末以方寸七內羊肉臚中服之○又方 桑根白皮切

三升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服之○又方 檳榔二十七枚治下節以水二升半先煮

其皮取一升半去滓內末頓服服即蟲出或不盡更合服取瘥止宿勿食旦服之

衍義 黃根走肝麻仁入脾肺故治寸白有效 麻無狼牙治蟲猛藥白飲散結止痛能解風氣百疾

胡椒根善透石竅故能治竅隙之蟲 太麻花治惡風毒血故其仁亦能治風殺蟲 麻油解毒安

白散風蟲亦風毒所化縱非治蟲之藥實為治蟲之用專取其潤而導之使下也 饒熱濕熱之味然  
雖款本性猶存羊臚之體投蟲所喜而為蟲濕同氣之治 桑根一味大泄肺氣故能下蟲非湯藥中  
配入他藥之此狀必生者乃效 檳榔泄胸中至高之氣破腹中委積之蟲總取獨用以擅專功  
論曰凡得傷寒症天行熱病腹中有熱又人食少腸胃虛三蟲行作求食蝕不五臟及下部若黃龍無  
色舌上盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜臥當數者其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懷



痛問此蟲在上蝕其五臟下唇內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能和可服此蝕蟲藥不傷  
蟲殺人也又曰凡患濕蟲者多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此  
病亦有乾蟲不甚濕利而下部瘡瘡不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦利單煮黃連及艾葉苦參之屬  
皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憤不知痛瘡處或下痢急治下部不曉此者但改其上  
不以下部為意下部生蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒重之

治傷寒蟲病方 取生雞子小頭叩出白入漆灰一合攪令極調當沫出更內著殼中仰吞之食頃或半  
日乃吐下蟲劇者再服盡熱除病愈

〔衍義〕 傷寒蟲病多由熱傷榮血結蟲聚令人狐疑昏或勢劇難堪者即以漆灰破血為主調雞子  
生吞引入肝經血分

治濕蟲方 黃連十分 生薑十分 苦參四分 艾葉八分 右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服久者  
服三劑

〔衍義〕 蟲乃濕熱蘊化故以黃連苦參苦燥之味療其濕熱兼取艾之純陽薑之辛散為同氣之內應  
毋問何蟲無不宜之

懊懷散 治濕蟲瘡爛殺除蟲方 篇竹半兩 蘆蘆 雷丸 青箱子 女青 桃仁略三 右六味治  
下節粥飲服方寸七日三加至二七亦可酒服

〔衍義〕 懊懷亦是蟲蟲為患故用篇竹蘆蘆殺氣分蟲雷丸青箱子女青桃仁破血蟲也  
青箱散 治熱病有蟲下部生瘡方 青箱子一兩 橘皮 篇竹略二 蘆蘆四兩 甘草一分 狼牙三分

右六味 治下節米飲和每服一合日三不品無和稍加之草無

〔衍義〕 青箱篇竹蘆蘆狼牙治蟲藥橘皮甘草調和中氣以行藥力  
蔓蔓湯 治濕蟲方 生薑汁五合 白蜜三合 黃連三兩 右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內



薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

**衍義** 方中一寒一熱分解濕熱借蜜引入蟲口濕熱之蟲無容身之地矣

治蟲蟲下部瘡穀道中生瘡方 阿膠 當歸 青柏子 略二 艾葉一把 右四味以咀以水八升煮取

二升半去滓分三服

**衍義** 青柏治蟲艾葉道熱阿膠當歸以和其血

杏仁湯 治蟲方 杏仁<sub>北</sub>五十 苦酒二升 鹽一合 右三味和者取五合頓服之小兒以意量之

**衍義** 杏仁上散肺氣下走大腸借酸鹹以收上逆之氣

桃皮湯 治蝨蟲蛔蟲及痔瘻蟲食下部生瘡方 桃皮 艾葉 略一槐子<sub>三兩</sub> 太棗<sub>三枚</sub> 右四味以咀以水三升煮取半升頓服之良

**衍義** 桃根白皮散血殺蟲艾葉溫血導火槐子益腎清火太棗入脾以通津液

猪膽苦酒湯 治熱病有蟲上下攻移殺人方 猪膽一具 苦酒半升和之火煎令沸三上三下藥成放

溫空腹飲三滿口蟲死便愈

**衍義** 蟲本肝家濕熱所化猪膽專治肝膽之熱以苦酒和之乃猪膽道多變法

治濕病下部有瘡蟲蝨入五臟方 雄黃 皂莢<sub>各一</sub> 麝香 硃砂<sub>各二</sub> 右四味為末蜜和搗萬杵初

得病酒服如梧子大一丸日二若下部有瘡取梧子大末內下部日二

**衍義** 雄黃解毒殺蟲皂莢滌飲開脾麝香和榮利竅硃砂辟邪以安神氣

雄黃兄散 治時氣病蟲下部生瘡方 雄黃二兩 桃仁<sub>半兩</sub> 青柏子 黃連 苦參<sub>各三</sub> 右五味為

末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服方寸七日三

治下部瘡瘡方 青黛 黃連 黃柏 丁香<sub>各一</sub> 麝香 一分 右五味治下飾以小棗大內下部中日

一度重者棗大和猪脂二三合灌下部中日二度

一度重者棗大和猪脂二三合灌下部中日二度



治下部生瘡方 濃煮桃皮煎如飴取內下部若口中有瘡含之

治濕蟲方 取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和相得平旦空腹服之仍  
削生薑二枚如鹵大以楸葉桃葉數重裹訖於爐灰中燒令極熟內下部中食頃著濕感者三旦作頓

服無有不瘥

治蟲蝕下部方 胡粉 雄黃 右二味等分為末著穀道中亦治小兒

治病蟲蟲方 燒馬蹄灰作末以猪脂和傅綿繩上內下部中日五度

治大孔蟲瘡方 蒸大棗取膏以水捻和長三寸綿裹訖宿內大孔中明旦蟲皆出水銀損腸宜慎之

治傷寒熱病多睡變成濕蟲四肢煩疼不得食方 羊桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之日正午時入

中坐一炊久不過二度瘥

治熱病蝕令人喜寐不知痛處面赤如醉下利膿血當數視其人下部孔穢穢然云搜赤即蠹瘡也

劇困殺人見人肝肺服藥不瘥可重之方 以泥作小甕令受一升竹筒一枝如指大一頭橫穿入

甕腹中一頭內入谷道中淺入可取熟艾如雞子大著甕中燃之於甕口吹烟令入人腹艾盡乃止大

人可益艾小兒減之蠹者勿多多亦害人日再熏不過三作蟲則死永斷亦可未燒雄黃如此熏之

衍義 下部蟲瘡雄黃最捷方中雄黃殺蟲桃仁逐血黃連苦參專解濕熱 連柏青黛散濕熱

麝香達竅隧丁香開導熱邪之去路 桃葉殺蟲下傳上含俱無妨礙 削生薑導以楸葉裏內下部

如無楸葉桃葉亦可代用不必二葉並熏也 胡粉入腎雄黃入心為殺陰毒瘡瘡之專藥 馬蹄散

血辟惡殺蟲亦可應用 水銀為殺蟲猛藥雖和棗膏見熱本質猶動大能損腸故云宜慎 羊桃壓


丹石毒亦能化蟲蟲艾熏以辟下部除蟲加雄黃尤效

孫真人備急千金要方衍義卷十八終











S957c

1915

v. 2, no. 17-18